

ଧାନ ଫସଲରେ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ, ପୋକ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା

ଦେବାଶିଷ ଜେନା, ସୁଜାତା ସେଠୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ସତ୍ତ୍ୱଜୀ,
ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି



ଧାନ ଦ୍ୱିତୃତୀୟାଂଶ ଭାରତୀୟ ତଥା ୬୫% ରୁ ଅଧିକ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ମୂଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ । ଭାରତରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିର ୨୩.୩% ଅଂଶରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ୪୩% ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନର ୪୬% ଅଟେ । ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଖରିପ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ଡାଲୁଆ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଜଳସେଚିତ ଜମି ଓ ବର୍ଷା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଖାଲ ଜମି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଜମିରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ତଥା ରୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୀଟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆକ୍ରମଣ ସହ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଘଟୁଥିବା ହ୍ରାସ ପାଇଁ କୀଟମାନେ ବହୁଅଂଶରେ ଦାୟୀ ଓ ଏମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନାୟମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୀଟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆକ୍ରମଣ ଧାରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଧାନରେ ପ୍ରମୁଖ

କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା କୀଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪ ରୁ ବଢ଼ି ୧୪ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେତେକ ନଗଣ୍ୟ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ରୋଗଯୋଗ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୧୫-୨୦% ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପାଗସହ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ରୋଗ ସହନ ଶକ୍ତି ନଥିବା କିସମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏପରିକି ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହି ପରାପ୍ରେକ୍ଷିରେ ପାଣିପାଗ ସୁଚନା ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ ଓ ଯୋକର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ପରିଚାଳନା ନିହାତୀ ଜରୁରୀ । ସଠିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଉନ୍ନତ ବିହନ, ସଠିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମିଶ୍ରଣରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଲାଭଜନକ ଉପାୟରେ ଯୋଗ ଓ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରୋଗ ଓ ଯୋକ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ଯୋକ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା

କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋକ

ପାଣିପାଗ : କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (୯୦-୧୦୦%) ସହିତ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ (୨୦-୩୦ °C) ରହିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ରୁ ରୁଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବର୍ଗ ମିଟର ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜ କିମ୍ବା ୫% ମୃତ ମଞ୍ଜି (ରୁଆ ରୁ ମଧ୍ୟମ ପିଲ ଅବସ୍ଥା)

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲି. କ୍ୟୁନାଲୋଫସ୍ କିମ୍ବା ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ ୦.୧୫% ୮୦୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କାହାଳିଆ ବା ବଙ୍ଗୀ ଯୋକ

ପାଣିପାଗ : କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷା/ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ରହିଲେ । ବିଳମ୍ବ ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ଅଧିକା ଲାଗେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ୫% ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲ / ବର୍ଗ ମିଟର ରେ ଗୋଟିଏ କାହାଳି ।



ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ବୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ / ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫% ଏସ୍ପି ୪୦୦ମି.ଲି. / କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ଇସି ୫୦୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି/ ଚକଡ଼ା ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ଜମିରେ ପାଣି ବେଶି ଦିନ ଜମା ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଯବସାରଜାନ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଘଞ୍ଚ ଭାବେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପରିବେଶ ଏହା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ପାଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨୧-୨୩°C ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ।



ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଦା ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟି ପୋକ (ପିଲ ରୁ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା), ବୁଦା ପ୍ରତି ୨୫-୩୦ ଟି ପୋକ (ଫୁଲ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା)

ପରିଚାଳନା : କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜମିର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ ୦.୧୫% ୮୦୦ମି.ଲି/ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ ୫୦% ଡବ୍ବୁଜି ୧୨୦ଗ୍ରାମ / ଡି ନେ । ଟେ ଫ୍ଲୁ ୪ ମି.ନ ୨୦% ଏସ୍ପି ୮୦ଗ୍ରାମ/ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮ଏସ୍ଏଲ ୫୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା (୮୦%), ମେଘୁଆ ପାଗ, ଅଧିକା ଯବସାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଅଧିକା ଘଞ୍ଚ, ଛାଇ ଜାଗା ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ରୁଆ ରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର

ପରିଚାଳନା : କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାଫିନୋଲ ୩ମି.ଲି. କୁ ୧୦ଲି. ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ ୨ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉକୁଣୀଆ ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ଶୁଖିଲା ପାଗ କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖଗଲେ ଏହି ପୋକ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ଡଳିଘରା ରୁରୁଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଦା ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟି ବୟସ୍କ ଯୋକ ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ ୦.୧୫% ୮୦୦ମି.ଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ ୫% ଇସି ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ବୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲେଡା ଯୋକ

ପାଣିପାଗ : ଅଧିକ ଦିନ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ପରେ ମୂଶଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହାର ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଣ୍ଡା ପବନ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଦୂର ଜାଗା କୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ରୁ କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଦା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରନ୍ତ ପିଲ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି ୨ଟି ଲାଭୀ ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ଇସି ୫୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ ୫% ଇସି ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ୟୁନାଲୋଫସ୍ ୨୫% ଇସି ୮୦୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗନ୍ଧି ଯୋକ

ପାଣିପାଗ : ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଖରାଟିଆ ପାଗ ଓ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଯୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଦା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବୟସ୍କ ଯୋକ ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ ୦.୧୫% ୮୦୦ମି.ଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ ୫% ଇସି ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ବୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ବିରିହା ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ପାଣି ଅଧିକା ଜମା ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ଓ ଦିନ ର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ଆସିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।



ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଢ଼ା ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ପୋକ କିମ୍ବା ୧-୨ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ଇସି ୫୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ ୫% ଇସି ୧୦୦ ମି.ଲି.କିମ୍ବା ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ନଳୀ ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ଫସଲ କିଆରିରେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠାଏଁ ଠାଏଁ ଜାଗାରେ ଏହି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ବୁଢ଼ା ପ୍ରତି ୧-୨ ନଳୀ ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ଇସି ୫୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ ୫% ଇସି ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ୟୁନାଲୋଫସ୍ ୨୫% ଇସି ୮୦୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଦହିଆ ପୋକ

ପାଣିପାଗ : ଡିପ ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ । ମରୁଡି ପଡିଲେ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବଢିଯାଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ ଏସଏଲ ୧୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



କନ୍ଦା ମାଛି

ପାଣିପାଗ : ସୂକ୍ଷ୍ମ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପାଣି ଜମିଥିବା କିଆରିରେ ତଥା ଛତା ଛତା ହୋଇ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଦିନର ଧାନ ଗଛରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା : ୨-୫% ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ।

ପରିଚାଳନା : ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ଇସି ୫୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫% ଏସସି ୪୦୦ମି.ଲି.କିମ୍ବା ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୪୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା

ମହିଷା ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ବାୟୁ ର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୬-୯୮% ଓ ରାତି ର ତାପମାତ୍ରା ୨୦-୨୪ °C ହେଲେ ଓ ଧାନ ତଳି କିମ୍ବା ପିଲ ଅବସ୍ଥା ରେ ରାତିରେ କାକର ପଡୁଥିଲେ । ଅନବରତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗିରହିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ରୁ ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ଏକ ଲି. ପାଣିରେ ୦.୬ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ ୭୫ ଡବ୍ଲୁପି କିମ୍ବା ୧ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରଚିତ୍ତା ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୦% କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ଏବଂ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ୨୮-୩୦°C ଏବଂ ଲଗାତାର ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ଏକ ଲି. ପାଣିରେ ୧ମି.ଲି.

ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ୨୫ଇସି କିମ୍ବା ୩ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ

୭୫ଡବ୍ଲୁପି କିମ୍ବା ୧ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ରାଛଦ ପୋଡ଼ା / ସାପକାତିଆ ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ବାୟୁ ର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୬-୯୭% ଓ ତାପମାତ୍ରା ୨୮-୩୪°C ଏବଂ ବର୍ଷା ଓ ଖରା ଅଦଳ ବଦଳ ରହିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ରୁ ପିଲ ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ବୁଦା ପିଛା ୩ଟି ରୁ ଅଧିକା ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ

ନାହିଁ । ଏକ ଲି. ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩ଏଲ କିମ୍ବା ୨ମି.ଲି. ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫ଇସି କିମ୍ବା ୧ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରାଛଦ ସଜା ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ବାୟୁ ର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ଓ ତାପମାତ୍ରା ୨୫-୩୨°C ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ଓ ଅଧିକା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ଧାନ ଗର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ରୁ ଧାନ ପାତିଲା ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ସଂକ୍ରମିତ ଫସଲର ଥୋଡ଼ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଲି. ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫ଇସି କିମ୍ବା ୧ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି କୁ ମିଶାଇ ୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ରାତିରେ ଅଧିକା କାକର ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଜମିରେ ଅଧିକା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଓ ଏହା ସହିତ ବାୟୁ ର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୬-୯୭% ଓ ତାପମାତ୍ରା ୨୫-୩୪°C ରହିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ରୁ କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ରୋଜବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିମାଇସିନ (୦.୧%) କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ (୦.୦୧%) ଦ୍ରବଣରେ ଅଧିକ୍ଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିମାଇସିନ ୧ଗ୍ରାମ ଓ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୮ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ମୂଳସଜା/ବାକାନୀ ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ରାତିରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅନବରତ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୦% ରୁ ଅଧିକା ରହିଲେ ଓ ଜମିରେ ଅଧିକା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ।

ବୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥା : ତଳି ଓ ରୁଆ ପରେ ।

ପରିଚାଳନା : ସଂକ୍ରମିତ ତଳି କିଆରି ରେ କିମ୍ବା ଧାନ ଖେତରେ ୧ଲି. ପାଣିରେ ୧ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ବୁ ପି କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରରେଖା/ପତ୍ରଗାର ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ବାୟୁ ର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୦-୯୪% ଓ ତାପମାତ୍ରା ୨୬-୩୨°C ରହିଲେ ଓ ଅଧିକା ବର୍ଷା, ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କମ୍ ରହିଲେ ।

ବୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥା : ପିଲ ରୁ କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ।

ପରିଚାଳନା : ରୋଜବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିନ (୦.୧%) କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପୁସାଇକ୍ଲିନ (୦.୦୧%) ଦ୍ରବଣରେ ଅଧିକ୍ଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିନ ୧ଗ୍ରାମ ଓ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୮ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସାହରା ରୋଗ

ପାଣିପାଗ : ରାତିର କମ୍ ତାପମାତ୍ରା (୨୫°C) ଓ ବାୟୁରେ ଅଧିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଧାନ କ୍ଷୀର ଢେଙ୍କିବା ଅବସ୍ଥା ରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ବୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥା : ଖୀର ଢେଙ୍କିବା ସମୟରେ ।

ପରିଚାଳନା : ୧ଲି. ପାଣିରେ ୦.୨୫ମି.ଲି. ଜମିଡାକ୍ଲୋପିଡ ୧୭.୮ ଏସଏଲ କିମ୍ବା ୦.୨ଗ୍ରାମ ଆକ୍ସୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ଡବ୍ବୁଜି କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଏନ୍.ଆର୍.ଆର୍.ଆଇ ବୈଷୟିକ ଇସ୍ତାହାର : ୧୫୨, ନଭେମ୍ବର - ୨୦୨୦

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

(Published under GKMS)

ସଂପାଦନା: ଦେବାଶିଷ ଜେନା

ସହଯୋଗିତା: ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଇ, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶୋଇ

