

कृषि सलाहकार सेवा

जुलाई 2026 के द्वितीय पखवाड़े की रणनीतियाँ

ऊपरीभूमि में शुष्क सीधी बुआई धान

- सीधी बुआई ऊपरी भूमि चावल में खरपतवारों के नियंत्रण हेतु, खरपतवारों के निकलने के 8-10 दिनों के बाद या खरपतवार 2-3 पत्ती अवस्था में हो, तो बिस्परिबैक सोडियम 10% एससी 120 मिली/एकड़ दर पर 16 लीटर क्षमता वाले 8 स्प्रेयर में छिड़काव करें या हाथों से निराई के विकल्प के रूप में नम मिट्टी में 20 दिन बाद फेनोक्साप्रॉप-पी-एथिल 9 ईसी 260 मिली/एकड़ की दर से प्रयोग करें।
- ऊपरीभूमि क्षेत्रों में जहां शाकनाशी का उपयोग नहीं किया गया है, पहली निराई हाथों से या यांत्रिक निराई फिंगर वीडर या व्हील हो द्वारा की जा सकती है। निराई के बाद 26 किलो यूरिया/एकड़ टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें।

निचलीभूमि में शुष्क सीधी बुआई धान

- सीधी बुआई वाले निचलीभूमि धान में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, बुआई करने के 15-20 दिनों बाद, खरपतवार के उभरने के 8-10 दिनों में या जब खरपतवार 2-3 पत्ती अवस्था में हों, नम मिट्टी में बिस्परिबैक सोडियम 10% एससी 120 मिली / एकड़ की दर से 16 लीटर क्षमता वाले 8 टैंकों में छिड़काव करें या 260 ग्राम फेनोक्साप्रॉप-पी-इथाइल (राइस स्टार) का टैंक मिश्रण+50 ग्राम एथोक्सीसल्फ्यूरॉन (सनराइज) प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।
- अर्ध-गहरे/गहरे पानी वाले क्षेत्रों में, जहां सीधी बुआई की गई है और खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी का उपयोग नहीं किया गया है, खेत में पर्याप्त पानी (कम से कम 7-10 सेमी खड़ा पानी) जमा होने के बाद 'बेउषण' किया जा सकता है। 'बेउषण' के बाद 18 किलो यूरिया/एकड़ टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें।
- वर्षाश्रित उथली निचली क्षेत्रों में जहां सीधी बुआई की गई है और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशी का उपयोग नहीं किया गया है, पर्याप्त पानी (कम से कम 7-10 सेमी खड़े पानी) जमाव के बाद 'बेउषण' किया जा सकता है। 'बेउषण' के बाद 36 किलो यूरिया/एकड़ टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें।

प्रतिरोपित धान

- लवणीय मिट्टी और लवणीय जल वाले क्षेत्रों में, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शुष्क नर्सरी न करें। ऐसे क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी सुविधाओं सहित सिंचाई के पानी के स्रोत के पास गीली क्यारी नर्सरी के लिए भूमि का चयन करें। गांव स्तर पर सामुदायिक नर्सरी उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है।
- जुलाई के दूसरे पखवाड़े के अंत तक नर्सरी की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।

- सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी सुविधाओं के साथ सिंचाई के पानी के स्रोत के पास गीली क्यारी नर्सरी के लिए भूमि का चयन करें। ग्राम स्तर पर सामुदायिक नर्सरी उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है।
- एक एकड़ क्षेत्र में रोपाई के लिए लगभग 320 वर्गमीटर क्षेत्र में नर्सरी क्यारी की आवश्यकता होती है।
- 10 सेमी ऊँचे, 1.2-1.5 मीटर चौड़े और सुविधाजनक लंबाई के गीले नर्सरी वाले क्यारी तैयार करें। दो क्यारियों के बीच में 30-45 सें.मी. चौड़ाई वाली सिंचाई/जल निकासी नाली रखी जानी चाहिए।
- नर्सरी में बुआई के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों की 14-16 किलोग्राम बीज/एकड़ और 5-6 किलोग्राम बीज/एकड़ संकर किस्मों का प्रयोग करें। कम उपजाऊ भूमि में, खेत की तैयारी के समय नर्सरी में नत्रजन, फोस्फोरस एवं पोटाश 6-3-3 ग्राम /वर्गमीटर की दर से उर्वरक डालें। जस्ता की कमी वाली मिट्टी में, 960 ग्राम जस्ता को ८ सेंट (320 वर्गमीटर) धान नर्सरी में आधारी मात्रा के रूप में प्रयोग करें।
- बुआई से पहले, बीजों को ट्राइकोडर्मा डस्ट फॉर्मूलेशन 10 ग्राम / किग्रा बीज दर से (धान के बीज को 8 घंटे के लिए पानी में भिगोएँ, ट्राइकोडर्मा डस्ट फॉर्मूलेशन के साथ मिलाएं और नर्सरी में बुवाई से 24 घंटे पहले नम बोरी या पॉलीथिन से ढककर ढेर के रूप में 12 के लिए स्टोर करें) या बीज को कैप्टन डब्ल्यूपी 50% (कैप्टन/कैप्टेफ/कैप्टन 50/गोल्डकैप) या थिरम 75% (थिरम 75 / थायरोक्स) या सीडकोट 750/सीडकैप) 3 ग्राम प्रति किलो बीज दर से या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य बीज उपचार रसायनों के साथ उपचारित किया जा सकता है।
- अधिक खरपतवार ग्रसित क्षेत्रों में धान की नर्सरी में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई करने 3-5 दिनों के बाद पायराज़ोसल्फ्यूरोन-इथाइल 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर पर 16 लीटर क्षमता वाले 8 टैंकों में छिड़काव करें या खरपतवार के निकलने के **8-10** दिनों में या जब खरपतवार **2-3** पत्ती अवस्था में हों, नम मिट्टी में बिस्पिरिबैक सोडियम **10%** एससी **120** मिली / एकड़ की दर से **16** लीटर क्षमता वाले **8** टैंकों में छिड़काव करें।
- नर्सरी में चावल के थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए बुवाई के समय 70% थियामेथोक्सम डब्ल्यूएस 1.5 मिलीलीटर/किलोग्राम की दर से बीज के साथ चावल के बीज का उपचार करें। यदि चावल की नर्सरी में थ्रिप्स का संक्रमण देखा जाता है, तो 0.15% नीम बीज कर्नेल-आधारित ईसी फॉर्मूलेशन 800 मिलीलीटर/एकड़ की दर से या लैम्डा-साइलाथ्रिन 5% ईसी 200 मिलीलीटर/एकड़ या थियामेथोक्सम 25% डब्ल्यूजी की दर से 40 ग्राम/एकड़ के साथ घोल की मात्रा 200 लीटर/एकड़ छिड़काव करें।
- नर्सरी की मिट्टी को थियामेथोक्सम 25% डब्ल्यूजी 800 ग्राम/एकड़ की दर से डुबोएं। ग्रीन लीफहॉपर, थ्रिप्स और व्होरल मैगॉट के प्रबंधन के लिए नर्सरी के प्रति वर्ग मीटर में 250 मिलीलीटर घोल का प्रयोग करें।
- यदि भूरा पौध माहू का संक्रमण ईटीएल (**5** संख्या/पहाड़ी – वृद्धि चरण, **2** संख्या/पहाड़ी - टुंग्रो स्थानिक क्षेत्र) के ऊपर देखा जाता है, तो एज़ाडिराक्टिन **5%** डब्ल्यू/डब्ल्यू **80** मिलीलीटर/एकड़ की दर से या इमिडाक्लोप्रिड **17.8** एसएल **50** मिलीलीटर/एकड़ की दर से या थियामेथोक्सम **25**

डब्ल्यूजी 40 ग्राम/एकड़ की दर से या एसफेथ 75% एसपी 400 ग्राम/एकड़ या फिपरोनिल 0.3% जीआर 10 किग्रा/एकड़ का उपयोग करें। छिड़काव के लिए 200 लीटर पानी का उपयोग करें।

- धान की नर्सरी में तना छेदक और पत्ता मोड़क फोल्डर के संक्रमण की निगरानी के लिए 3 फेरोमोन ट्रेप/एकड़ रखें। जब भी नर कीट/जाल की संख्या 4 या 5 तक पहुँच जाए, तो अज़ाडिराक्टिन 0.15% ईसी 800 मिली/एकड़ दर पर या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 4% जीआर 4 किग्रा/एकड़ 1:1 के अनुपात में रेत के साथ मिलाकर या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी 60 मिली/एकड़ 200 लीटर पानी दर पर या करटाप हाइड्रोक्लोराइड 4जी 10 किग्रा/एकड़ दर पर छिड़काव करें।
- जड़-गाँठ सूत्रकृमि और तना छेदक आक्रांत क्षेत्रों में नर्सरी क्षेत्र में बुवाई के 5 दिन बाद, कार्बोफ्यूरेन के दाने 3 ग्राम/वर्गमीटर दर पर या फोरेट 1 ग्राम/वर्गमीटर दर से या डायज़िनॉन 1 ग्राम/वर्गमीटर प्रयोग करें।
- यदि अंकुरित पौधों में अंगमारी दिखाई दे तो प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी (टिल्ट/जेरॉक्स/धन/बम्पर) 1 मिली / 1 लीटर पानी की दर से प्रयोग करें।
- यदि नर्सरी में पत्ता प्रध्वंस देखा जाता है, तो टेबुकोनाज़ोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यूजी 0.4 ग्राम या आइसोप्रोथियोलेन 40ईसी (फुजिता/फुजिओन/सुल्तान) 1.5 मिली प्रति लीटर दर पर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 7-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव दोहराएं।
- धान की नर्सरी में बकाने की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यूपी 1ग्राम/लीटर पानी दर पर छिड़काव करें और 7-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव दोहराएं।
- भूरे धब्बे के मामले में, प्रोपिकोनाजोल 25ईसी 1 मिली या मांकोजेब 75 डब्ल्यूपी दर से या कार्बेन्डाजिम 64%+ मांकोजेब 63% 75 डब्ल्यूपी (साफ/ सेफ/ सराफा) 1.5ग्राम/ लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- चावल के खेत में पीला तना छेदक (स्किर्पो ल्यूरे) और लीफ फोल्डर की निगरानी के लिए 4-5 फेरोमोन ट्रेप/एकड़ स्थापित करें। जब भी नर कीटों/ट्रेप की संख्या 4 या 5 तक पहुँच जाती है, तो एज़ाडिराक्टिन 0.15% नीम बीज कर्नेल आधारित ईसी फॉर्मूलेशन 800 मिली/एकड़ की दर से या छिड़काव दानेदार कीटनाशक क्लोरेंट्रानिलिप्रोले 0.4% जीआर 4 किग्रा/एकड़ की दर से या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4जी 10 किग्रा/एकड़ की दर से 1:1 के अनुपात में रेत के साथ मिलाकर या क्लोरेंट्रानिलिप्रोले 18.5% एससी की दर से 60 मिली/एकड़ या टेट्रानिलिप्रोले 200 एससी (18.18% डब्ल्यू/डब्ल्यू) की दर से 100-120 मिली/एकड़ या फ्लुबेडियामाइड 20 डब्ल्यूजी 50जी/एकड़ के साथ स्प्रे घोल की मात्रा 200 लीटर/एकड़ छिड़काव करें।
- तना छेदक और पत्ता मोड़क संक्रमण के प्रबंधन के लिए क्रमशः तीन कार्ड (जिसमें ~ 60000 परजीवी अंडे होते हैं) प्रति हेक्टेयर पर अंडा परजीवी, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम (एनआरआरआई ट्राइकोकार्ड-टी.जे) और ट्राइकोग्रामा हिलोनिस (एनआरआरआई ट्राइकोकार्ड-टी.सी) जारी करें जब जब कीट दिखाई दें। अंडा द्रव्यमान या कीटों की गतिविधि नहीं देखी जाती है, जो भी पहले हो, हर 7-10 दिनों के अंतराल पर ऐसे पांच बार जारी करें।
- जब भी पत्ती फोल्डर (दो मुड़े हुए पत्ते/पहाड़ी) की क्षति देखी गई, तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोले 18.5 % एससी 60 मिली/एकड़ की दर से या टेट्रानिलिप्रोले 200 एससी (18.18 % डब्ल्यू/डब्ल्यू) 100-120 मिली/एकड़ की दर से या फ्लुबेडियामाइड 20 डब्ल्यूजी 50 जी/एकड़ की दर से छिड़काव करें। छिड़काव के लिए प्रति एकड़ स्प्रे मात्रा के रूप में 200 लीटर पानी का उपयोग करें।

- झूंड वाली इल्लियों/केस वर्म/हिस्पा के संक्रमण के मामले में, क्लोरपाइरीफोस 20 ईसी 500 मिलीलीटर/एकड़ या किनाल्फोस 25% ईसी 800 मिलीलीटर/एकड़ की दर से छिड़काव करें। छिड़काव के लिए प्रति एकड़ स्प्रे मात्रा के रूप में 200 लीटर पानी का उपयोग करें।
- गॉल मिज संक्रमण के मामले में, फिपरोनिल 05% एससी 400-600 एमएल/एकड़ या थायामेथोक्सम 25% डब्ल्यूजी 40 एमएल/एकड़ या लैम्डा-साइलोथ्रिन 5% ईसी 100 एमएल/एकड़ या क्लोरपाइरीफोस 20 ईसी 500 एमएल/एकड़ या कार्बोफुरान 3% सीजी 20 किग्रा/एकड़ की दर से उपयोग करें। छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का उपयोग करें।
- यदि भूरा पौध माहू की संख्या ईटीएल (5-10 हॉपर्स/पूजा) से अधिक हो जाती है, तो वैकल्पिक गीला और सुखाने की तकनीक (एडब्ल्यूडी) का पालन करके धान के खेत की सूक्ष्म जलवायु को बदलें (पानी को खेत में लंबे समय तक स्थिर नहीं रहना चाहिए)। यदि समस्या अभी भी बनी रहती है, तो ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरीम 10% एससी 94 मिली/एकड़ या पाइमेट्रोज़िन 50% डब्ल्यूजी 120 ग्राम/एकड़ या डिनोटिफ्पूरान 20% एसजी 60-80 जी/एकड़ या थायामेथोक्सम 25% डब्ल्यूजी 40 मिली/एकड़ या एथेफोनोप्रोक्स 10% ईसी 200-300 मिली/एकड़ या एसफेथ 75% एसपी 400 ग्राम/एकड़ या फिपरोनिल 5% एससी 400-600 एमएल/एकड़ की दर से छिड़काव करें। छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का उपयोग करें। भूरा पौध माहू के खिलाफ निर्दिष्ट/अनुशंसित खुराक पर ही कीटनाशकों का उपयोग करने से बचें। बीपीएच के संक्रमण के दौरान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करने से बचें।
- यांत्रिक प्ररोपक का उपयोग करके प्रत्यारोपण के लिए, प्रत्यारोपण से 15-20 दिन पहले मैट नर्सरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 4:1 के अनुपात में बारीक मिट्टी को फार्म यार्ड खाद या कृमिखाद के साथ मिलाएं। अच्छी तरह से मिश्रण के बाद, मिश्रण को लगभग 2 सेमी मोटाई के लिए अंकुर ट्रे या पॉलीथीन शीट पर फैलाएं। पॉलीथीन शीट पर मिट्टी फैलाने और इसे समान बनाने के लिए, लकड़ी का उपयोग करें या लोहे का फ्रेम 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। फ्रेम को मिट्टी के मिश्रण से लगभग ऊपर तक भरें और इसे समतल करें।
- पहले से अंकुरित बीजों को मिट्टी के मिश्रण पर समान रूप से फैलाएं। यदि नर्सरी खुले क्षेत्र में उगाई जाती है तो बीज को मिट्टी के मिश्रण की एक पतली परत (0.5 सेमी) और पुआल या केले के पत्तों की एक पतली परत से ढक दें। 2-3 दिनों के बाद पुआल या केले के पत्ते को हटा दें। नियमित अंतराल पर सिंचाई करते हुए मिट्टी की नमी बनाए रखें। एक प्रतिशत क्षेत्र में उगाए गए पौधे एक एकड़ क्षेत्र में प्रतिरोपण के लिए पर्याप्त हैं।
- मुख्य खेत की भूमि की तैयारी 7-10 दिनों के अंतराल पर दो बार खेत को कीचड़दार बनाकर और एक समान फसल स्थापना के लिए भूमि को समतल करना चाहिए। पहली बार खेत को कीचड़दार करने से पहले लगभग 0.8 टन/एकड़ अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर डाला जा सकता है।
- मुख्य खेत में, खेत को प्रारंभिक समय पर कीचड़दार करने से पहले ढेंचा हरी खाद की फसल को शामिल करें।
- अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए, अंतिम बार कीचड़दार करने के समय आधारी मात्रा के रूप में 44 किग्रा डीएपी + 33 किग्रा एमओपी या 22 किग्रा यूरिया + 125 किग्रा एसएसपी + 33 किग्रा एमओपी डालें। रेतीली मिट्टी में, 44 किग्रा डीएपी और 16.5 किग्रा एमओपी या 22 किग्रा यूरिया + 125 किग्रा एसएसपी + 16.5 किग्रा एमओपी डालें।

- संकर किस्मों के लिए, अंतिम बार कीचड़दार बनाने के समय **53** किग्रा डीएपी + **27** किग्रा एमओपी या **26** किग्रा यूरिया + **150** किग्रा एसएसपी + **27** किग्रा एमओपी आधारी खुराक के रूप में डालें।
- जस्ता की कमी वाले क्षेत्रों में अंतिम भूमि की तैयारी के समय जिंक सल्फेट **10** किग्रा / एकड़ की दर से या जिंक-ईडीटीए **6** किग्रा / एकड़ की दर से (दो साल में एक बार) डालें।
- बोरॉन की कमी वाली मिट्टी में अंतिम भूमि की तैयारी के समय **2** किलो प्रति एकड़ की दर से बोरेक्स डालें।
- **25-30** दिन वाली पौध की रोपाई **20 x15** सेमी के अंतर पर उथली गहराई पर करनी चाहिए, अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए प्रति पूंजा केवल **2-3** पौध का प्रयोग करें। संकरों के लिए प्रति पूंजा **1-2** अंकुरों का प्रयोग करें।
- खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, दानेदार शाकनाशी बेनसल्फ्यूरॉन मिथाइल **0.6%** + प्रीटिलाक्लोर **6%** जीआर **4** किग्रा / एकड़ दर से **4** किग्रा रेत के साथ मिलाकर **5-10** दिनों के भीतर रोपाई के बाद या बिस्पाइरिबैक सोडियम **10%** एससी **120** मिली / एकड़ की दर से **16** लीटर के **8** टैंक में डालें। खरपतवारों के उभरने के **8-10** दिनों के बाद (या जब खरपतवार **2-3** पत्ती अवस्था में हों) छिड़काव करें।

जहां सामान्य मानसून नहीं हुआ है, उन वर्षाश्रित क्षेत्रों के लिए सलाह

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां ऊपरीभूमि धान की खेती नहीं की जाती है, वहां मिट्टी की उपलब्ध नमी का उपयोग करके कम अवधि वाली अन्य फसल जैसे मूंग, उड़द, रागी, मूंगफली और अरहर की बुवाई की जा सकती है।
- भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, बीज की बुवाई और उर्वरकों या शाकनाशी के टॉप ड्रेसिंग को कुछ समय के लिए रोक दें।
- सीधे बोए गए चावल में मिट्टी की नमी की उपलब्धता के साथ उर्वरक की पहली टॉप ड्रेसिंग की जा सकती है।
- मिट्टी में पर्याप्त नमी न होने पर खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए चावल के खेत में शाकनाशी का छिड़काव न करें।