

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ
ଧାର ଓ ପରିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
ନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର
ରଞ୍ଜିତା ରାଣୀ ରଥ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାଶ
ଗାୟତ୍ରୀ ସିଂହ

Citation

Kumar U, Rath RR, Dash L and Sinha G. (2026).

Organic Package of Practices of Rice and Vegetables for Odisha (In Odia).

“CRRI Extension Bulletin No.32”

ICAR - Central Rice Research Institute,
Cuttack - 753006, Odisha.

Funded by:

Production, Popularization and Supply of Quality
Bioinoculants for Rice-based Cropping and Farming
System of Odisha (EAP 416).

Published by:


Director, ICAR-Central Rice Research Institute,
Cuttack
April, 2026

Laser types & printed by:

Print-Tech Offset Pvt. Ltd, Bhubaneswar

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
୧	ଉପକ୍ରମ	୫
୨	ଧାନ୍	୬
୩	ଓ. ଏସ.ଆର.ସି.	୧୩
୪	ଟମାଟୋ	୧୬
୫	ବାଇଗଣ	୧୯
୬	ଲଙ୍କା	୨୧
୭	କଖାରୁ	୨୩
୮	କଦମ୍ବଳ	୨୫
୯	ହଳଦୀ	୨୭
୧୦	ଅଦା	୩୦



ଉପକ୍ରମ

ଧାନ ଭାରତ ର ୬୫% ଜନସଂଖ୍ୟା ର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ଏହାର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ୪୪. ୬ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅଟେ । ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫସଲ ଠାରୁ ଅଧିକ। କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି (APEDA) ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଚ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ (PGS), ଭାରତ ର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୈବିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି, ବିଶେଷ କରି ବସୁମତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଲି ଚାଉଳ, ଲଉରୋପିଅ ଦେଶ ତଥା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଓ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କୃଷି ମନୁଶାଳୟ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ଭାରତ ସରକାର ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (PKVY) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ (MOVCD-NER) ପାଇଁ ମିଶନ ଜୈବିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାହିତ କରୁଅଛି । ସେହି ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରେ ପରିପରିବା ପ୍ରତିଦିନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ମନିଟରିଙ୍ଗ ବ୍ୟୁରୋ (NNMB) ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ ଦେଶର ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ବିବିଧତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ବହୁ କମ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିମାନ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଅଛି । ଆଣ୍ଡ୍ରାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଆଦିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ, ମାଛ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ପାରିବା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି (GLV, ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ମନିଟରିଙ୍ଗ ବ୍ୟୁରୋ ୨୦୧୯) । ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଅନୁସାରେ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ପରିବା (GLV) ୪୦ ଗ୍ରାମ /CU /ଦିନ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ୨୪ ଗ୍ରାମ /CU/ ଦିନ ରହିଛି ।

ଫୋର୍ସଗାଙ୍ଗସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ (FiBL) ସର୍ବେ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜୈବିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୧୮୬ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଜୈବିକ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ୭୧. ୫ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର କୃଷି ଜମି ଜୈବିକ (ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ଷେତ୍ର) ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୬ ଓ ୧୫ଟି ଦେଶରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ / ୫ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୈବିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ । ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଜୈବିକ ଅଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨. ୮ ନିୟୁତ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଜୈବିକ ବଜାର ୯୬. ୭ ବିଲିୟନ ଯୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨. ୮ ନିୟୁତ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯୦% ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଯୁରୋପରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକ ଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ (୧, ୧୪୯, ୩୭୧) ତାପରେ ଉଗାଣ୍ଡା (୨୧୦, ୩୫୨) ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ (୨୦୩, ୬୦୨), ତେବେ ୨୦୧୭ ତୁଲନାରେ ୫ % ରୁ ଅଧିକ (୧୪୦, ୦୦୦) ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧ ହୁଏ ୨. ୮ ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ PKVY ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଭାରତର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଏବଂ ବିବିଧ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରୋସାହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାରେ PKVY ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯୮୭୫ ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଅନଲାଇନ ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦର ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ www.jaivikkheti.in ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ସେଇଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ

(RCOF), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଲାଗି ଏକ ପ୍ଲଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରା ଯାଇଛି । PGS କ୍ଲଷ୍ଟର କୃଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ କୃଷକ ଙ୍କ ଠାରୁ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ / କ୍ରୟ ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ।

ଶ୍ରୀ ସୌରଭ ଗର୍ଗ (IAS, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, କୃଷି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର), ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମୋହନ (ସାବରମତୀ ର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ) ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସମ୍ପ୍ରତି, ଜୈବିକ ଚାଷ ଅଧୀନରେ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯାହାକି ଜୈବିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ (ଭାନ, ବୃଗେନ, ଏଚ. ଅଲ. ୨୦୧୬: ଭାନ ବୃଗେନ ଏବଂ ପିଙ୍କ, ୨୦୧୬) । ଅବଶ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର ଜୈବିକ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ (POP) ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଣ୍ଠାଲିପି ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ଧାନ, ଚମାଚୋ, ଲଙ୍କା, କଖାରୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଦା ଚାଷ କୁ ଲେବ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ।

ଧାନ



ଫସଲ: ଧାନ

ମାଟି: ଆଲୁଭିଆଲ୍, ବାଲୁଆ ମାଟି ଏବଂ ଚିକିଟା ମାଟି

ଉପର ମାଟି: ୧୮ - ୨୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀର

ପି. ଏଚ୍.: ୫ ରୁ ୬. ୫

ଜଳବାୟୁ: ତ୍ରୁପିକାଲ୍ ଓ ସବ ତ୍ରୁପିକାଲ୍ ।

ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା: ୨୧-୩୫°C ।

ଜୈବିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ଅମଳ ର ପସ୍ଥାୟ:

- ଧାନ - ଶିମ୍ବୁ / ଚମାଟୋ / କାକୁଡି / ଲାଲ କଖାରୁ / ଗାଜର - ସବୁଜ ଖତ
- ଫସଲ (ମଞ୍ଜି ପାଇଁ)
- ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ - ମସୁର / ପନିପରିବା ମଟର / ଆଳୁ / ସୋରିଷ / ହରଡ ଡାଲି ।
- ଧାନ - ବିରି - ରାଶି
- ଧାନ - ଚିନା ବାଦାମ / କପା - ଚାଉଳ

ଧାନ କିଷମ:

ସଅଳ କିଷମ: ଖଣ୍ଡଗିରି, ସହାଭାଗୀ ଧାନ ।

ମଧ୍ୟମ କିଷମ: ହିରଣ୍ମୟୀ, IR ୮ ।

ବିଳମ୍ବ କିଷମ: ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ, ସବ -୧

ସୁଗନ୍ଧିତ କିଷମ: ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ, ନୂଆ କଳା ଜିରା।

କୁଦ୍ରତ - ୫, ବାଂଶୁନି ମୁଣ୍ଡି, ହଳଦୀ ଧାନ, ଗଡ଼କୁଟଟା, ସପୁରି ଧାନ, ବେତ୍ରା ଧାନ, କୋଲ୍‌ରିକୁଡି, ଲକଡିକୁଡି, ଉମରିଆତୁରି, ଲିମ୍‌ତୁରି, ଆସାମତୁରି, ମାୟେରଧାନ, ପତ୍ରଧାନ, (ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁଚନା ସ୍ରୋତ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ର ବେଲୁଗାଁ ର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ କମଳି ବତ୍ରା)

ବିଭିନ୍ନ କିଷମ ଅନୁଯାୟୀ ବିହନ ପରିମାଣ (କେଜି / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି)

ବିହନ ହାର (କେଜି / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି): -

ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ: -

- ବିଳମ୍ବ କିଷମ ଅବଧି: ୩୦ - ୬୦
- ମଧ୍ୟମ କିଷମ ଅବଧି: ୪୦- ୬୦
- ସଅଳ କିଷମ ଅବଧି: ୬୦ - ୭୦
- ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ବର୍ଷାକାଳୀନ ବିହନ : ୮୫ - ୧୦୦

ବିହନ ବିଶୋଧନ

ଗୋମୂତ୍ର ର ବ୍ୟବହାର: ୫୦୦ ମିଲିଲିଟର ଗୋ - ମୂତ୍ର କୁ ୨. ୫ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ, ବିହନ କୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସେଇ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ।

ଗୋବର ର ବ୍ୟବହାର: - ସତେଜ ଗୋବର (୦. ୫ କି.ଗ୍ରା) ଓ ଗୋମୂତ୍ର (୨ ଲିଟର) ୫ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ୧୦- ୧୫ କି.ଗ୍ରା ବିହନ କୁ ପ୍ରଥମେ ୧୦- ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ରେ ଏବଂ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ରେ ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ବଶୋଧିତ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ତଳି ଘେରା ରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ।

ଛେଳି ର ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରି ୩୦ ଦିନ ପୁରୁଣା ବିହନ କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛେଳି ଗୋବର ଦ୍ରବଣ ରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ବିହନ ର ଅଂକୁରଦଗମ ବୃଦ୍ଧି ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାଏ ।

ବତ ଗଛ ର ନିର୍ବାହ ବ୍ୟବହାର କରି

୧. ୨୫ କି.ଗ୍ରା ବତ ମଞ୍ଜି ରାଇଜୋମ ପାଉଡର କୁ ୬ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ରେ ବାନ୍ଧି ସେହି ଦ୍ରବଣ ରେ ଭିଜାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ କୁ ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ।

ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବ୍ୟବହାର କରି

ବିହନକୁ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍/ସୁଡୋମୋନାସ୍/PSM, ଅଣ୍ଟା ଭାତ ଫେଜ ମିଶ୍ରଣ ରେ ଭିଜାଇ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଇଥାଏ । ବିହନକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ।

ଛଟା ବୁଣା ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ (DSR)

ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜାମୂତ (୨୦୦ ଗ୍ରାମ / କିଗ୍ରା ବିହନ ପ୍ରତି) ଏବଂ ଟ୍ରାଇକୋଟେର୍ମା ଭିରିଡି (୮ ଗ୍ରାମ / କିଗ୍ରା ବିହନ ପ୍ରତି) ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ରେ ବିଶୋଧିତ କରା ଯାଇଥାଏ । ତାପରେ ବିହନ କୁ ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ପୁଣି ଥରେ ବିହନ କୁ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଏବଂ PSB ଜୈବ ଉର୍ବରକ (୧୦ ଗ୍ରାମ / କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି) ରେ ମିଶାଇ ଛାଇ ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ବିହନ କୁ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ।

ତଳି ଘେରା ରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ

ବିହନ କୁ ବିଜାମୂତ / ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇକୋଟେର୍ମା ଭିରିଡି ଓ PSB ମିଶ୍ରଣ ରେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଉଭୟ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ତଳି ଘେରା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ୨୪ - ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ଇନକ୍ୟୁବେସନ ର ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।



ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି

- କ୍ଷେତ କୁ ଘାସ ମୁକୁ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ ର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ ଥର କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
- ଚିନାବାଦାମ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ କେକ୍ କୁ ୧୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକ ଖତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।



ପ୍ରତିରୋପଣ

- ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତା ରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ ଟି ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ବିହନ କୁ ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୀବାମୃତ କିମ୍ବା ଅମୃତପାଣି ରେ ଭିଜା ଯାଇଥାଏ ।
- ଚାରା ବୃଦ୍ଧିର ସମାନତା କୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାରା ର ଅଗ୍ର ଭାଗକୁ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।
- ପତ୍ରର ଅଗ୍ର ଭାଗରେ କୀଟ, ପୋକ, ଅଣ୍ଟା ଆଦିକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ଦରକାର ।

ଧାନର କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ତଳିରୁଆ ର ବ୍ୟବଧାନ (ସେଣ୍ଟିମିଟର):

- ବିଳମ୍ବ କିସମ ଅବଧି - ୨୦× ୧୫
- ମଧ୍ୟମ କିସମ ଅବଧି - ୨୦× ୧୦
- ସଅଳ କିସମ ଅବଧି - ୧୫× ୧୦

ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ପ୍ରାଥମିକ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ପ୍ରତିରୋପଣ ର ୧୫- ୨୦ ଦିନ ପରେ (DAT) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୪୫ (DAT) ପରେ କୋନୋ ଝିଡର ସାହାଯ୍ୟ ରେ ରୋପଣ ର ୩୫ ଦିନ ପରେ (DAT) ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ।

ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

- କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଖତ (FYM ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨- ୮ ଟନ), ଭର୍ମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ (୫- ୧୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର) ଓ ଏଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ (୨ କେଜି / ହେକ୍ଟର) ଓ PSB (୨ କେଜି / ହେକ୍ଟର) ର ପ୍ରୟୋଗ ।
- ଛେଳି ର ଖତ (୧. ୨୫ ଟନ / ହେକ୍ଟର), କୁକୁଡ଼ା ଖତ (୧. ୨୫ ଟନ / ହେକ୍ଟର), କାଠ ପାଉଁଶ (୧. ୨୫ ଟନ / ହେକ୍ଟର)।



- ଗ୍ଲାଉରିସିଡିଆ ପତ୍ର (୫ ଟନ / ହେକ୍ଟର) ।
- ୬- ୭ ଦିନରେ ବ୍ଲୁ-ଗ୍ରୀନ ଆଲଗୀ (BGA) (୧୦ କେଜି / ହେକ୍ଟର) ର ପ୍ରୟୋଗ ।
- ସଂଜୀବକ / ଜୀବାମୃତ ୪୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅତିକମ୍ରେ ରେ ଡିନି ଥର (୫୦୦ ଲିଟର) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ସଂଜୀବକ / ଜୀବାମୃତ, ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ନିମ୍ନ ପତ୍ର ରସ (୨ କିଗ୍ରା) ବ୍ୟବହାର ଧାନ ଫସଲରେ ହେଉଥିବା ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡ ବିନା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ।
- ୩ ଥର କିମ୍ବା ୪ ଥର ମିଶ୍ରିତ ଅମୃତ ପାଣି / ଗୋମୂତ୍ର / ମିଶ୍ରିତ ଭର୍ମିଖାଣ ର ସଞ୍ଚନ ହୋଇଥାଏ ।
- ନିମ୍ନ ପତ୍ର / ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି ର ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଭର୍ମିଖାଣ / ନିମ୍ନ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

ତରଳ ଜୈବିକ ସାର ପରିଚାଳନା

- ଧାନ ରୁଆ ହେବା ର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ହଳ ସମୟରେ:
- ଜୀବାମୃତ ୨୦୦ ଲିଟର ଏକର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

୭-୧୫ (ରୋପଣ ଦିନ ୦।ରୁ (DAT)):

- ତରଳ NPK ଅଣୁଜୀବ ମିଶ୍ରଣର ଜୈବ ଉର୍ବରକ (୫୦୦ ମି.ଲି/ଏକର ପ୍ରତି) + ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା FYM/ ଭର୍ମିକୋମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ରେ ୩ ଦିନ ଧରି ଧରି ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ରୋପଣ ର ୨୦ ଦିନ ପରେ (DAT):

- ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ୩୦ ମିଲିଲିଟର / ଲିଟର ପ୍ରତି ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଯାଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ

ପ୍ରୟୋଗ ରେ ଜୀବାମୃତ ୨୦୦ ଲିଟର / ଏକର ପ୍ରତି ମାଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- ରୋପଣ ର ୪୦ ଦିନ ରେ (DAT):
- ଜୀବାମୃତ ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ।

ରୋପଣ ର ୬୦ ଦିନ ରେ (DAT):

- ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ କୁ ପତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାମୃତ କୁ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ:

- ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ର ଆଉ ଏକ ମାତ୍ରାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ।

ଜୈବିକ ସାର

- ଆଜୋଲା ସହିତ ଧାନ ଚାଷ: ୧୦-୧୫ ଟନ ସତେଜ ଆଜୋଲା / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
- ସତେଜ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈଖାଳ (BGA) ୫୦ -୬୦ କି.ଗ୍ରା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈଖାଳ (BGA) ୬/୭ କି.ଗ୍ରା ।
- ଏଜୋସ୍ଟାଇରୁଲମ୍ କିମ୍ବା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକଟର ୫-୬ କି.ଗ୍ରା / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି / କିମ୍ବା ୫୦୦ ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ।
- AM କବକ ଏକ ଟନ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ।
- ଫସଫେଟ ଦ୍ରବଣକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ (PSM) ୫- ୬ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ୫୦୦ ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ୩% ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ (ଟିଲର ଏବଂ ବୁଟିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେ)



ସବୁଜ ପତ୍ର ଖତର ବ୍ୟବହାର :

ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଟଲଙ୍ଗ ର ପତ୍ର

ଜଳସେଚନ : ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜଳ ଉଠିକି ରହିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ।

କୀଟ ଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ / ପରିଚାଳନା

ଯୋକ

• ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ସମ୍ଭାଳୁଆ:

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି ର ଶସ ୫% (NSKE) ର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

• ପତ୍ରମୋଡା ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଶୂଳ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଦଉଡି ପକଡି ।

ପାଚିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡା ଲାଗି ଖେତ ସାରା ସରୁ ପତ୍ର ଏବଂ ବତାପି ପତ୍ର କୁ ବିଛାଯାଇଥାଏ ।

• ସାଆରା ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ସତେଜ କରତ ପତ୍ର ୧୦ କି.ଗ୍ରା (୧୦୦ ମିଟର ସ୍ପ୍ରେୟର ଏରିଆ ପ୍ରତି) ବିଛା ଯାଇଥାଏ ।

• ସବୁଜ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ନିମ୍ନ ଏବଂ କରଞ୍ଜ ତେଲ କୁ ୧:୪ ଅନୁପାତ ରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

• ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଲାଇଟ ଟ୍ରାପିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।

ଲାସିଓସିଫୋନେରିଆ ସେଫାଲସ ପତ୍ର ର ରସ ବ୍ୟବହାର (ପ୍ରସ୍ତୁତି : ୧ କି.ଗ୍ରା ପତ୍ରକୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଛାଣି ପାଣି ସହ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ । ତଳି ପକା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ରୋପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅରଖ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଖେତରେ ବିଛା ଯାଇଥାଏ ।

• କାହାଳିଆ ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଅଫାମାର୍ଗ (ଶିଖରୀ) ଗଛର ଚେରକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନିମ୍ନ ଗଛ ଛାଲିର ଗୁଣ୍ଡ ସହ ମିଶାଇ ପାଣି ସହ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ (ଶିଖରୀ ଚେର ଗୁଣ୍ଡ ୨୫ କି.ଗ୍ରା, ନିମ୍ନଛାଲି ୧୨. ୫ କି.ଗ୍ରା / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମିଶ୍ରଣ ରେ ୧ ଲିଟର କିରୋସିନ ଏବଂ ୪ ରୁ ୫ କିଲୋ ଧାନର ଖଦଡା (କୁଣ୍ଡା) ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯୋକ :

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ନିମ୍ନ କେକ୍ (୪୨- ୫୦ କିଲୋ) କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

○ ଟ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଜାଫୋନିକମ ର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଯୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

○ ଲାଇଟ ଟ୍ରାପ ପକଡି ମାଧ୍ୟମ ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହୁଏ ।

ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

• ଜୀବାଣୁ / ଭୂତାଣୁ : ୧ ଲିଟର ବଟର ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର, ୧ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର କୁ ୮ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

• ଧାନ ର ମହିଷା ରୋଗ :

- ୨ କିଗ୍ରା ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୁ ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ୨ ମିଲିଲିଟର ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରଣ କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସେହି ମିଶ୍ରଣ କୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ୧୦% ଗୋମୂତ୍ର କୁ ୧୦ ଦିନ ରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ ରେ ବାଦାମୀ ପତ୍ର ଦାଗ :

- ୧୦ % ଭର୍ମିଖାଣ + ୫ % ଗୋମୂତ୍ର କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପୋଦିନା ପତ୍ର ର ରସ (୨୦%) ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- କରତା ଗଛ ର ପରିପକ୍ୱ ପତ୍ର କୁ ୨୫ ବର୍ଗ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ବିଛାଇ ସଜିବା ଲାଗି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ୩ ଦିନ ପରେ କ୍ଷେତ କୁ ଭିଜା ଯାଇଥାଏ ।
- ପାଉଁଶ କୁ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ।

ଧାନ ର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ

୨୦ କେଜି ଗାଈ ଗୋବର କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ବହୁଳିଆ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ମିଶ୍ରଣ କୁ ଛାଣି ୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମିଶ୍ରଣ କୁ ସିଞ୍ଚନ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ଅମଳ :

- ଶସ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିପକ୍ୱ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ପରି ହେବା ପରେ ଅମଳ କରାଯିବା ଉଚିତ (ଧାନର କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ) ।
- ଶସ୍ୟ ର ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୫% ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮୦% କେଣ୍ଡା ରେ ପ୍ରାୟ ୪୮୦% ପାଚିଲା ଧାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଫସଲ

୫-୬ ଟନ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚାଉଳ ପାଇଁ ୨- ୩ ଟନ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡିଶା, ଧାନ ଚାଷ ର ପଙ୍କତି (OSRC)

ଓଡିଶା ର ଧାନ ଚାଷ ର ପଙ୍କତି ବା OSRC ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାନ ସଫଳ କୃଷି ପଙ୍କତି (SRI), ଯାହାକି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ୧୯୮୦ ମସିହା ରୁ ୧୯୯୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମାଡାଗାସ୍କର

ହେଉଛି SRI ର ଉତ୍ପତ୍ତି । ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ପଦ୍ଧତି କୁ ଆପଣେଇ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କମ୍ବୋଡିଆ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରେ SRI ର ପରୀକ୍ଷା ଖରିଫ୍ ସିଜିନ ରେ କରାଯାଇଥିଲା , ଯାହାର ଆଶାନ୍ୱରୂପ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କୃଷକ ଏହି ପଦ୍ଧତି କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।



ଭୂମି ଚୟନ

ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ - ଉଚ୍ଚ ଭୂମି, ମଧ୍ୟମ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଅଟେ । ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମି ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ବିହନ ଚୟନ

ବିହନ ହାର (୫-୬ କି.ଗ୍ରା / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି), ୩୧୫୦ ଦିନ ଅବଧି ର ଉନ୍ନତ କିଷମ ର ବିହନ ମଧ୍ୟମ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଲାଗି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୨୦ ଦିନ ଅବଧି ର ଉନ୍ନତ କିଷମ ର ବିହନ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଲାଗି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତି

- ୧ ଏକର ରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ୬ ଟି ଛୋଟ ଶଯ୍ୟା (ଆକାର ୨୦ ଫୁଟ x ୪ ଫୁଟ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ଶଯ୍ୟା ର ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଟି ଶଯ୍ୟା ରେ ୨୫ କି.ଗ୍ରା ଚାଷ ଜମି ଖତ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ ଆଂଶିକ ଅଙ୍ଗୁରିତ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳି ଘେରା ରେ ଅତି ପତଳା ଭାବରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁଖ୍ୟ ଜମିର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଭଲ ଭାବରେ ଜମି କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ । ଜମି କୁ ୨ ରୁ ୩ ଥର କାନ୍ଥୁଅ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ ଥର ହଳ କରିବା ସମୟରେ ବାଦାମ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ କେକ୍ ୧୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ରେ ପ୍ରାଥମିକ ତୋଜ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି କୁ ସ୍ତର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ କାନ୍ଥୁଅ ବିହନ ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜଳସ୍ତର ବଜାୟ ରଖି ପତଳି କରିବା ଉଚିତ ।

ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ

ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ ରେ କୋଦାଳ / କଡ଼ାଇ / ଫ୍ଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳଭସଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ୮- ୧୪ ଦିନର ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ କୁ ବାହାର କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବଧାନ

- ୨୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୨୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର
- ୨ ଟି ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୧୦- ୧୨ ଦିନ ପୁରୁଣା ଯାହାକି ଗର୍ଭାଶୟ ସହ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ଜୈବିକ ନିବେଶ

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ରେ FYM ୧୦ ଟନ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ, ସଂଜୀବନୀ ମିଶ୍ରଣ (୧୦ କେଜି ଗୋବର ଓ ୧୦ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ କୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚନ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଥାଏ) କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭର୍ମିଝାଣ ର ସିଞ୍ଚନ

ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନ (DAT) : ୧୦% ଭର୍ମିଝାଣ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

୨୦ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେହି ମାତ୍ରା ରେ ଭର୍ମିଝାଣ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥାଏ ।

ତୃତୀୟ ଥର ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ରେ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ର ଅଧା ହୋଇଥାଏ (୫%)।

ଜଳସେଚନ

ମାଟି କୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖା ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସଠିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର । ପରିପୃଷ୍ଠତା ରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖା ଯାଇଥାଏ ।

ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଘାସ ପରିଚାଳନା କୋନୋ ଷ୍ଟିଡର ପଦ୍ଧତି ରେ କରା ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ କୋନୋ ତୃଣକ ପଦ୍ଧତି ୨୦ ଦିନ (DAT) ରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୪୫ ଦିନ (DAT) ରେ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ଗଛ ର ସୁରକ୍ଷା ନିମ୍ନ ତେଲ ଏବଂ କରଞ୍ଜ ତେଲ କୁ ୧:୪ ଅନୁପାତ ରେ କିମ୍ବା ୫% NSKE କୁ ସିଞ୍ଚନ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ଅମଳ

ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିବା ପରେ ଅମଳ କରା ଯାଇଥାଏ, ଶସ୍ୟ ର ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୦- ୨୫ % ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ୮୦% ପାଚିଲା କେଣ୍ଡା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।

OSRC ର ଲାଭ

- ବିହନ ର କମ୍ ମୂଲ୍ୟ
- ଅଳ୍ପ ଜଳ ର ଆବଶ୍ୟକତା
- କେବଳ ଜୈବିକ ଖତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ
- ମୂଲ୍ୟ ସଂଚୟ
- ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷ ର ବ୍ୟବହାର
- ଗଛ ର ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ
- ବିହନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ



ଧାନ - ମାଛ - ବତକ - ଆଜୋଲା ର ମଡେଲ

ପ୍ରଥମେ ଜମି ର ଏକ ପୁନଃ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଏକ ଧାନ ବିଲ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ହୋଇ ପାରିଥାଏ । ସେହି ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବା ସହ ମାଛ ଏବଂ ବତକ ମଧ୍ୟ ଛୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ (ଏହା ଏକ ଘନିଷ୍ଠ - ଏକୀକରଣ ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ) ।

ବିଲାତି (ଟମାଟୋ)

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ : *Lycopersicon esculentum* L.

କିଷମ : ବ୍ୟାକଟେରିଆ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କିଷମ - ଅର୍କ ରକ୍ଷକ, ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ, ଶକ୍ତି, ସିନାଲି, ଅର୍କ ଆଭା ।

ନେମାଟୋଡ଼ ଓ ବ୍ୟାକଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କିଷମ - ଅର୍କ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଭର୍ଟିସିଲିୟମ ।

ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କିଷମ - ପନ୍ଥବାହାର

OUAT କିଛି ନୂତନ କିଷମ ର ଟମାଟୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି - ଉତ୍କଳ ଉର୍ବଶୀ, ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ।

ମୃତ୍ତିକା : PH ୬. ୫ ରୁ ୭. ୫ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଭରପୂର ମାଟି ରେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ବିହନ ବୁଣିଧା ସମୟ ଖରିଫ - ଜୁଲାଇ - ଅଗଷ୍ଟ (ବର୍ଷା ହେତୁ ବୁଣା ଯାଏ ନାହିଁ)

ରବି - ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର ।

ତଳ ଘେରା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି FYM (୧୦ କିଗ୍ରା) ନିମ୍ନ କେକ୍ (୧ କେଜି) VAM ୧୫୦ ଗ୍ରାମ / ପ୍ରତି ମିଟର ସ୍ଥାନ ରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିହନ ହାର ୩୦୦- ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କିଷମ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିଷମ ର ବିହନ ୧୦୦- ୧୫୦ ଗ୍ରାମ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଦ୍ୱିସାବ ରେ ବୁଣାଯାଇଥାଏ ।

ବିହନ ର ବିଶୋଧନ

ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୧ କେଜି ଚମାଚେ। ବିହନ କୁ ୪ କେଜି ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା କିମ୍ବା ସୁଡୋମୋନାସ୍ ଫ୍ଲୋରେସେନସ ୧୦ କେଜି ଓ ଏଜୋସ୍ପାଇରୁଲମ୍ ୪୦ ରୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବିଶୋଧିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ନର୍ସରୀ ଶଯ୍ୟା ରେ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବିଶୋଧିତ ବିହନ କୁ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ । ତା' ପରେ ସେହି ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ ଉପରେ ବାଲି ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଫଳ ରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଂକୁରଦଗମ ହୋଇପାରିବ।

କିଷମ ହିସାବ ରେ ବ୍ୟବଧାନ

ସାଧାରଣ କିଷମ ପାଇଁ ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୪୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ହାଇକ୍ରିଡ଼ କିଷମ ପାଇଁ ୪୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଥାଏ ।

ମଲ୍‌ଚିଙ୍ଗ୍ ଏହି ମଲ୍‌ଚିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତି ରେ କଳା LDPE ସିଟ ବା କଳା ହାଲୁକା ପଲିଥିନ (୨୫ ମାଇକ୍ରୋନ ମୋଟେଇ) ଉପରେ ମଲ୍‌ଚିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପଲିଥିନ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତା ରେ ମାଟି ରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ତୃଣ ପରିଚାଳନା

ତୃଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ର ୩୦ ଦିନ ପରେ ସଫା କରା ଯାଇଥାଏ ।

ହାଇକ୍ରିଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ତାଲିମ ଗଛ ଲଗାଇବା ର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଭୂମି ସ୍ତର ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୦ ରୁ ୧.୫ ଉଚ୍ଚତା ରେ ଷ୍ଟେକ ବା କାଠର ବାଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ରେ ଗଛ ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର କୁ ଉଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।

ଜଳସେଚନ

ବିହନ ବୁଣା ଯିବାର ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବୁଦା ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଉର୍ବରକ ପ୍ରୟୋଗ

- ଶେଷ ଥର ହଳ ହେବା ପୂର୍ବ ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ FYM କୁ ୨୫ ଟନ/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହାର ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଏଜୋସ୍ପାଇରୁଲମ୍ (୨ କେଜି/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର) ଏବଂ ଫସଫୋ ବ୍ୟାକଟେରିଆ (୨ କେଜି/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର) ର ମିଶ୍ରଣ କୁ FYM (୫୦ କେଜି) ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟ ପାଇପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଯାଇ ବୁଦା ଜଳସେଚନ ବା ଦ୍ୱିପ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

କୀଟ ପୋକ ପରିଚାଳନା ର ଅଭ୍ୟାସ

ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

- ସଂକ୍ରମିତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇ ଥିବା ଲାର୍ଭା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।

- ୪୦ ଦିନ ର ପୁରୁଣା ଲଙ୍ଗ ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ୨୫ ଦିନ ପୁରୁଣା ଟମାଟୋ ର ବିହନ କୁ ୧:୧୬ ଅନୁପାତ ରେ ଧାଡ଼ି ରେ ଲଗା ଯାଇଥାଏ । ଫେରୋମନ ଟ୍ରାପ (୧୨ ଟି ହେକ୍ଟର ପିଛା) ସହିତ ହେଲିଲୁଟ ଟ୍ରାପ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥାଏ ।
- ଟ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ପ୍ରତିଓସମ କୁ HaNPV ୧.୫× ୧୦^{୧୨} POBs/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଓ NPV ର H. ଆରମ୍ଭିଗେରା
- ୦.୪୩%, ୩୦ ମିଲିଲିଟର/ପ୍ରତି ଲିଟର ବା ୨ % ୧.୦ ମିଲିଲିଟର/ପ୍ରତି ଲିଟର ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
- ସ୍ପ୍ରେଡୋପେରା ଲିଟୁରା ର Pinterest ପାଇଁ SINPV ୧. ୫× ୧୦^{୧୨} POBs ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପତ୍ର କଟା ପୋକ

ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପତ୍ର କୁ ବଛା ଯାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆ ଯାଏ ଏବଂ NSKE (୫%) କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ

କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଟ୍ରାପ କ୍ରପିଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତି ରେ ଚାଷ କଟାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥାଏ । ଲାଇଟ ଟ୍ରାପ ୧ ଟି ଲେଖାଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଓ ଫେରୋମୋନ ଟ୍ରାପ (ଫେରୋଡିନ SL) ୧୫ ଟି ଲେଖାଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋକ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପୋକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ SINPV (୧.୫× ୧୦^{୧୨} POBs/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହାର ରେ) ଓ ଅଣୋପିତ ଚିନି (୨. ୫ କିଗ୍ରା) ଏବଂ ଟିପୋଲ (୦.୧%) ର ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜଉ ପୋକ

ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ର ଷ୍ଟିକ ଟ୍ରାପ ୧୫ ଟି ଲେଖାଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଲାତି ର ପତ୍ର ମୋଡା ଭୂତାଣୁ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ/ନେଟ ହାଉସ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧରୀ ବନାଯିବା ଦରକାର । ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଟ୍ରାପ ୧୨ ଟି ଲେଖାଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଲଗାଯିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ । କ୍ଷେତ ରେ ଚାରିପଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶସ୍ୟ ଲଗାଯିବା ଦରକାର । ତୃଣ ସବୁ କୁ ସଫା କରାଯିବା ଦରକାର ।

ବିଲାତି ର ମୋକାଇକ ଭୂତାଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ରୋଗମୁକ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୁ ସଂଗୃହିତ ସୁସ୍ଥ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯିବା ଦରକାର । ସୁସ୍ଥ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଛାଇ ରେ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ନିର୍ଦ୍ଧରୀ ରୁ ସଂକ୍ରମିତ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯନ୍ତ୍ର ର ସହିତ ଅଲଗା କରି ବହୁ ଦୂରତା ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ସଂକ୍ରମିତ ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ବିହନ ବୁଣିବା ଶଯ୍ୟା କୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯିବା ଦରକାର ।
- ଆଲୁଅ ଏବଂ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଦେବା ଦରକାର ।
- ଭଲ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର ।
- ବିହନ ର ବିଶୋଧନ ଟ୍ରାଇକୋଥର୍ମା ଭିରିଡି (୧ କେଜି /୨୫୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ ପ୍ରତି) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ଯାଇପାରେ ।

ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଫସଲ ରେ ଆବର୍ଜନା ଆଦି କୁ ବାହାର କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କୁ ସେହି କ୍ଷେତ ରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ଥାଏ (କ୍ରପ ରୋଟେସନ) ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ର ମାତ୍ରା କୁ କମ୍ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ।

ବ୍ୟାକଟେରିଆ ଜନିତ ସଜା ରୋଗ

କ୍ରପ ରୋଟେସନ ବା କ୍ଷେତ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଯେମିତିକି ମକା, କୋବି, ଭେଣ୍ଟି, ବାଇଗଣ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ର ଚାଷ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଅମଳ ୪୫- ୫୦ ଟନ/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର



Fig - 1 ଫଳ ବିନ୍ଧାପୋକ



Fig-2 ପତ୍ର ମୋଡ଼ାଭୂତାଣୁ



Fig - 3 ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପୋକ

ବାଇଗଣ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ: *Solanum melongena* L.

ମୂଳିକା: ଭାରୀ ମାଟି, କାଦୁଆ ମାଟି ।

କିଷମ : ଉତ୍କଳ ରାଣୀ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ଉତ୍କଳନୁଶ୍ରୀ, ଉତ୍କଳ ମାଧୁରୀ, ପୂଜା ବାଇଗଣୀ ଲଙ୍କା, ଗୁଲାବୀ, ଭାଗ୍ୟମତୀ, ସବୁଜ ଲଙ୍କା, ସବୁଜ ରାଉଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମଳା, ପୁଷ୍କାକ୍ରାନ୍ତି, ପଞ୍ଚ- ସମ୍ରାଟ, KT - ୪, sel - ୩, sel - ୪, sel - ୫ ।

ବିହନ ବିଶେଷ

ବିହନକୁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୪ ଗ୍ରାମ ବିହନ ହାରରେ ବା ବୀଜରାଶି କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶୋଧିତ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ବିହନ ହାର

କିସମ : ୨୬୦ ଗ୍ରାମ/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର,
ହାଇବ୍ରିଡ - ୧୨୦ ଗ୍ରାମ/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ।

ବିହନ ବୁଣିବା ସିଦ୍ଧି

ବର୍ଷ ସାରା ବାଇଗଣ ଲଗାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ର ଜଳବାୟୁ ହିସାବରେ ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।



ଖରା ଦିନରେ ଫେବୃଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଗଭୀର ହଳ କରିବା ଦରକାର ।

ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଧାତି ରୁ ଧାତି ୭୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛ ରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସାର ଶେଷ ଥର ଜମି ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ଟନ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ FYM ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

୨ କେଜି/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଏଜୋସ୍ପାଇରୁଲିନ ଓ ଫସଫୋ - ବ୍ୟାକଟେରିଆ ୨ କେଜି / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହାରରେ ୫୦ କେଜି FYM ସହ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜମି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ

ଜଳସେଚନ ମୃତ୍ତିକା ର ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜଳସେଚନ ୭-୧୦ ଦିନରେ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ । ଶୀତ ଦିନେ ଫଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କୁ ଅମଳର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ।

କୀଟ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ନେମାଟୋଡ଼ ବା ସୂତ୍ରକୃମି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପାଉଁର ୧-୨ ଗ୍ରାମ/ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଚେର ରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ କୁ ୧୫- ୨୦ ମିନିଟ ୨ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ୧ କିଗ୍ରା ଚର୍ମାଫଟ ମାଟି, ୧ କିଗ୍ରା ଗାଈ ଗୋବର ପାଣି ରେ ବୁଡାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
- ହଳଦିଆ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ର ଅଠାଳିଆ ଟ୍ରାପ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟି ଏକର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷକ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ର ଅଣୁ ୨୦, ୦୦୦/ ଏକର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଟ୍ରାପ ଫସଲ ଯେମିତି କି ପିଆଜ, ଗେଣୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ।
- ଫଳ ବିନ୍ଧା ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମାସ୍ତ୍ରାମ ଓ ଆଗ୍ରେୟାସ୍ତ୍ରମ ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ୫% NSKE କୁ ପ୍ରତି ୨୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଶୋଷକ ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗଛ ଲଗାଇବା ପରଠାରୁ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଯନ୍ତ୍ରା ଜମି ମଧ୍ୟ ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗେଣୁ ଚାରା (୨୦୦ ପ୍ରତି ଏକର) କୁ ବାଇଗଣ ଚାରା ମଝିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଜନିତ ରୋଗ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଥାଏ।

ଅମଳ ୧୫- ୨୦ ଟନ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ।

ଲଙ୍କା

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ: - *Capsicum annum* L.

ମୂଳିକା : କଳା ମାଟି, ନାଲି ମାଟି, ଜଳସେଚିତ ଫସଲ ପାଇଁ କାଦୁଆ ମାଟି ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ତାପମାତ୍ରା : ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ମୂଳିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି : ହାଲୁକା ହଳ ଏବଂ ଗଭୀର ହଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ବିହନ ହାର : ୨୫୦ ଗ୍ରାମ/ ଏକର ପ୍ରତି
ସାଧାରଣ କିଷମ ଲାଗି ଏବଂ ୧୦୦-୧୮୦ ଗ୍ରାମ / ଏକର ପ୍ରତି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିଷମ ଲାଗି ।



ବିହନ ବିଶୋଧନ : ବିହନ କୁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ୫୬ ଗ୍ରାମ ଏକେଜି ବିହନ ପ୍ରତି ହାରରେ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ତଳି ଘେରା ପରିଚାଳନା

ଏକ ଶତକଡ଼ା (୪୦ ମିଟର) ଜମି ପାଇଁ ଏକ କେଜି ର ନିମ୍ନ ପାଉଡର, ଏଜୋସ୍ପାଇରୁଲମ୍, ଫସଫରସ ଦ୍ରବ୍ୟୀଭୂତ କରୁ ଥିବା ବ୍ୟାକଟେରିଆ ଓ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ମାଟି ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥାଏ । ଉଚ୍ଚା ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୬ ସପ୍ତାହ ର ଚାରା କୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

କିସମ : G-୩, G-୪, ସିନ୍ଦୂରୀ, କିରାଉ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଲାମ - ୩୦୫, L- ୩୩୪ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବିହନ ବୁଣିବା ସିଜିନ

ଖରିଫ - ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ

ରବି - ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ନଭେମ୍ବର

ବ୍ୟବଧାନ : ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଫସଲ (ରେନ୍ ଫେଡ୍) ପାଇଁ ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଫସଲ ପାଇଁ ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ।

ସମନ୍ୱୀତ ସାର ପରିଚାଳନା

- ୪୫ ଦିନ ପୂର୍ବ ରୁ ଧଣିଚା (ସବୁଜ ଫସଲ ଖେତ) ମାଟି ରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ
- ପୂର୍ବ ରବି ଫସଲ ଭାବରେ ମୁଗ ଏବଂ କଳା ଚଣା ର ମିଶ୍ରଣ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥାଏ
- ୧୦ ଟନ୍/ପ୍ରତି ଏକର FYM, ଏଜୋସ୍ପାଇରୁଲମ୍ - ୨ କେଜି, PSB - ୨ କେଜି, VAM - ୫ କେଜି / ପ୍ରତି ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ
- ୨୫୦୦ କେଜି NADEP କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ
- ରୋପଣ ସମୟରେ ଜୀବାମୃତ ୧୨୫ ଲିଟର / ପ୍ରତି ଏକର, ଚାରା ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥାଏ
- ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ ୩୦ ଦିନ (DAT) ପରେ ପୁଣି ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ
- ଜୀବାମୃତ ୨୦୦ ଲିଟର ପରିମାଣ ରେ ୪୦ ଦିନ, ୬୦ ଦିନ, ୮୦ ଦିନ, ୧୦୦ ଦିନ (DAT) ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥାଏ

ସମନ୍ୱୀତ କୀଟ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ / ପରିଚାଳନା

- ରୋପଣ ପୂର୍ବ ରୁ ଚାରା ର ଚେର କୁ ବୀଜାମୃତ ରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇ ଥାଏ ।
- ତିନି ଧାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯେମିତିକି ମକା, ଧାନ, ଯଅ, ବାଜରା, ଆଦି ଲଗା ଯାଇଥାଏ ।
- ଟ୍ରାପ ଶସ୍ୟ ଯେମିତି କି ଗେଣୁ, ପିଆଜ ଓ ଧନିଆ ଆଦି ଶୋଷକ ପୋକ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଲଗା

ଯାଇଥାଏ ।

- ଧାତୁରା ଗଛ ର ପତ୍ର ର ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଜଉ ଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ସିଞ୍ଚନ କରା ଯାଇଥାଏ ।
- ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟି ଜଡ଼ା ଗଛ ଏକର ପ୍ରତି ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଫଳ ବିକାଶ ଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ର ଅଠାଳିଆ ଟ୍ରାପ ର ବ୍ୟବହାର ଧଳା ମାଛି ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି କରା ଯାଇଥାଏ ।
- ସ୍ପୋଡୋପେଡ୍ରା (ପତ୍ର କଟା ଯୋକ) ଓ ହେଲିକୋଭେରପା ଯୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଫେରୋମୋନ ଟ୍ରାପ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚାଗଭ୍ୟ କୁ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ସିଞ୍ଚନ କରା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଶୋଷକ ଯୋକ ଙ୍କ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
- ଫସଲ ର ଆଖ ପାଖ ରେ ଘାସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର । ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ବଣୁଆ ମାଛି ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୫% NSKE ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଗୋବର + ଗୋମୂତ୍ର + ଇଙ୍କୁଆ ର ମିଶ୍ରଣ ର ପ୍ରୟୋଗ ଥ୍ରୀପ୍ସ ଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥାଏ ।
- ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା କାର୍ଡସ ୫ ଟି ଲେଖାଁ ଏକର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ବ୍ୟାକଟେରିଆ ଜନିତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬ ଲିଟର ବଟର ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ରେ ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରା ଯାଇଥାଏ ।
- କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳ ସତ୍ତା ରୋଗ ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ଓ ଆତ ପତ୍ର ର ମିଶ୍ରଣ କୁ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଲଙ୍କା ଅମଳ

ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫ - ୨୦ ଟନ୍ ଲଙ୍କା ।

କଖାରୁ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ: *Cucurbita pepo* L.

କିଷମ: କୋ ସିରିଜ୍ (୧ ଓ ୨), ଅର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ।

ମୃତ୍ତିକା: ବାଲିଆ ଓ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ରେ ଭରପୂର ମୃତ୍ତିକା କଖାରୁ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

PH ୬. ୫ ରୁ ୭. ୫ ମଧ୍ୟ ରେ ଥାଏ ।

ସିଜିନ୍: ଜୁନ ରୁ ଜୁଲାଇ, ଡିସେମ୍ବର ରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ କଖାରୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ।

ବିହନ ହାର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏକ କିଗ୍ରା ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ବିହନ ବିଶେଷତା : ୩୦ ଦିନ ଯାଏଁ ବିହନକୁ ପାଣିରେ (୧:୨ ଅନୁପାତ ରେ) ଭିଜାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୬ ଦିନ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ, ବିହନ କୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ରୁ ସେଥିରେ ଏଜୋସ୍ପିରୁଲମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ।

ବିହନ ବୁଣା : ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା ରେ ୫ ଟି ଲେଖାଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ମନ୍ଦା ରେ ୨ ଟି ଲେଖାଁ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବଧାନ: ୨×୨ (ମିଟରରେ) ମନ୍ଦା (ପିଟ୍) ର ଆକାର ୩୦×୩୦×୩୦ (ସେଣ୍ଟିମିଟର) ।

ସାର ର ମାତ୍ରା : ୨୫ ଟନ୍/ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର FYM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥାଏ । ଷେଡ ରେ ଶେଷ ଥର ହଳ କରିବା ପୂର୍ବ ରୁ ଏଜୋସ୍ପିରୁଲମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକଟେରିଆ (PSB) ୨ କେଜି/ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଓ ସିଉଡୋମୋନାସ୍ ୨. ୫ କେଜି/ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି, ୫୦ କେଜି FYM ଓ ୧୦୦ କେଜି ନିମ୍ନ କେଲ୍ ସହ ମିଶାଇ ଷେଡ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଜମି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ

ତୃଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛ କୁ ଡିଜିଥର ସଫା କରାଯାଇଥାଏ । ଇଥିରେ ୦. ୨୫ ମିଲିଲିଟର / ଲିଟର ପ୍ରତି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୪ ଥର ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ବିହନ ବୁଣିବା ର ୧୫ ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ତଳି ଘେରା ବୃଦ୍ଧି

- ହାଇ - ଟେକ୍ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପାଇଁ ତଳି ଘେରା ରୁ ୧୨ ଦିନ ର ସୁସ୍ଥ ଚାରା ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ୯୮ ଟି ସେଲ୍ ଥିବା ପୋର୍ଟ୍ ଟ୍ରେ ରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- ଭଲ ଭାବେ ରେ କମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥିବା କୋକୋ ପିଟ୍ କୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
- ପ୍ରତି ସେଲ୍ ରେ ୧ ଟି ଲେଖାଁ ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥାଏ | ଦିନ କୁ ଦୁଇ ଥର ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
- ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଥିବା ଫଳ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।



- ମାଛି ମାନଙ୍କ ର ସଂଖ୍ୟା ଗରମ ଦିନେ କମ୍ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ରହି ଥାଏ, ସେହି ହିସାବ ରେ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।
- କ୍ଷେତ କୁ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୩. ୦% ନିମ୍ନ ତେଲ କୁ ପତ୍ର ରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ରୋଗ

ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ (ପାଉଡରି ମିଲଡିଉ)

ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଅଥା ଚାମଚ ଡିଟେରଜେଣ୍ଟ ନ ଥିବା ତରଳ ସାବୁନ କୁ ଏକ ଗ୍ୟାଲନ ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଗଛ ରେ ଉପଚାରିକ ଭାବେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗ (ଡାଉନି ମିଲଡିଉ)

ନିମ୍ନ ତେଲ ୨୫ ରୁ ୩୦ ମିଲିଲିଟର କୁ ୧ ଲିଟର ଇମଲିଫାୟାର ସହ ମିଶାଇ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ୨ ଅର ଲେଖାଁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

କନ୍ଦମୂଳ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ: *Ipomoea batatas* L

ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ:

ଲୋକପ୍ରିୟ କିସମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରେ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନୀ, କିରଣ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ, ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରା, ଗୌରୀ ଓ କୋ - ୩ ଆଦି ।

ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରେ - ମୁସିରି ଥଣ୍ଡେଲ, SP- ୪, SP-ଲୋକାଲ, SP-୧୩ ଓ SP-୧୮ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମୃତ୍ତିକା: ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ମୃତ୍ତିକା (PH - ୫. ୬ ରୁ ୬. ୬) କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।



ସିଜିନ : ଖରିଫ ସିଜିନ - ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଚାଷ ଜମି କୁ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଟି ର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ହୁଡ଼ା ଏବଂ ଶିଆର ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବିହନ ବୁଣା ଯାଇପାରିବ ।

ରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ

କନ୍ୟାମୂଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାରା ଗୁଚ୍ଛ ରୁ ଗଣ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

୩ ମାସ ର ପରିପକ୍ୱ ତେର ଗୁଚ୍ଛ ଯାହାର ଲମ୍ବ ୧୦- ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟ ରେ ଥାଏ ସେଥିରୁ ୨ ରୁ ୩ ଟି ନୋଡ୍ ବା ଗଣ୍ଠି କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଜୋସ୍ପିରୁଲମ୍ (୪୦୦ ଗ୍ରାମ) ଓ ପାଣି ର ମିଶ୍ରଣ ରେ ଭିଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଚାରା ରୋପଣ : ୮୦, ୦୦୦ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

ଜଳସେଚନ : ଚାରା ରୋପଣ ପୂର୍ବ ରୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

୩ ଥର ରୋପଣ ପରେ ଏବଂ ତା ପରେ ସପ୍ତାହ କୁ ଥରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅମଳ ର ଠିକ୍ ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସାର ର ପ୍ରୟୋଗ : FYM ୨୫ ଟନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଓ ଏଜୋସ୍ପିରୁଲମ୍ ୨୫ କେଜି ହେକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଣାଳୀ : ତେର ଗୁଚ୍ଛା ରେ ଗଣ୍ଠି ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି କୁ ଟୁଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା କୁ ହୋଇଥାଏ । ରୋପଣ ର ୨୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ମାଟି କୁ ଖୋସାଇବା କୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋପଣ ର ୫୦ ରୁ ୭୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

କୀଟ ନାଶକ :

କନ୍ୟାମୂଳର କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ର ଉପାୟ -

- ପୂର୍ବ ଫସଲ ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କୁ ଅପସରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଜଳ୍ପ ହୋଷ୍ଟ (ଉଦାହରଣ : ଇପୋମୋଇ ଏସ. ପି) କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ।
- ସୁସ୍ଥ ଗଣ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରାଯିବା ଦରକାର ।
- ରୋପଣ ର ୫୦ ଦିନ ପରେ ମାଟି କୁ ଖୋସାଇ ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ।
- ଶସ୍ୟ ପାଚିଲା ହୋଇଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅମଳ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଫସଲ ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ।

ରୋଗ

ସଫୁ ରଟ୍ ବା ସଢା ରୋଗ ସଢା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିହନ କୁ ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକ କେଜି ବିହନ ହିସାବ ରେ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା କୁ FYM ସହ ମିଶାଇ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅମଳ : ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ରୋପଣ ର ୧୧୦ ରୁ ୧୨୦ ଦିନ ରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ହଳଦୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ : *Curcuma longa* L

ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ କେଶର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଫ୍ୟାମେଲି : ଜିଙ୍ଗିବେରାସି

ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି : ଦକ୍ଷିଣ - ପୂର୍ବ - ଏସିଆ

ଜଳବାୟୁ : ଆର୍ଦ୍ର (୧୨୦୦ MSL), ୧୫୦୦ ମି.ମି ବର୍ଷା ଏବଂ ୨୦ ରୁ ୩୦ °C ତାପମାତ୍ରା ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।



ମୃତ୍ତିକା : ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ନାଲି ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । pH - ୫ ରୁ ୭. ୫ ମଧ୍ୟ ରେ ଥାଏ ।

ବର୍ଷର ଜୋନ୍ : ଅଣ - ଜୈବିକ କ୍ଷେତ୍ର ରୁ ୨୫ - ୫୦ ଫୁଟ ।

ରୂପାନ୍ତର ଅବଧି : ୨ ବର୍ଷ

କିଷମ : ଉପଯୁକ୍ତ ଜୈବିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଷମ ର ହଳଦୀ ଚୟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେହି କିଷମ ଗୁଡିକ କୀଟ ରୋଗ ଏବଂ ନେମାଟୋଡ଼ ର ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ।

IISR କିଷମ : କ୍ରିଷ୍ଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ସୁଗୁଣା, ସୁଦର୍ଶନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୋନିଆ ଆଦି ।

ଓଡିଶା ର କିଷମ : ରଙ୍ଗ, ରଞ୍ଜୁ, ରୋମା, ସୁରମା (OUAT ଦ୍ଵାରା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା କିଷମ) ।

ବିହନ ହାର : ମୂଳ ରାଇଜୋମ୍ ବା ଶାଖା ରାଇଜୋମ୍ ୧୨- ୧୫ ଗ / ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ

ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା ହର୍ଜିଆନମ / ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା ଭିରିଡି ଓ ଗ୍ରାମ / ପ୍ରତି ୧ କେଜି ରାଇଜୋମ୍ ସହ ମିଶାଇ ୩୦ ମିନିଟ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସଂଚୟ କରିବା ସମୟ ରେ ବା ରୋପଣ କରିବା ସମୟ ରେ ବୀଜାମୃତ ଓ ଜୀବାମୃତ ର ମଧ୍ୟ

ପ୍ରୟୋଗ କରିଯାଇ ପାରିବ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବିହନ ର ବିଶୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ରେ ସାଧାରଣତଃ - ୧ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ୧୦୦ ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ ଓ ୫ ଲିଟର ପାଣି ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ରେ ୧୦ କେଜି ବିହନ କୁ ଭିଜାଇ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

୨୦ ରୁ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତା ରେ ୨- ୩ ଥର ହରୋଇଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥାଏ ।



ବିହନ ବୁଣିବା ର ସମୟ : ଅପ୍ରେଲ ରୁ ମେ ମାସ ।

ବ୍ୟବଧାନ :

୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ଶଯ୍ୟା ରେ), ୪୦- ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୨୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ହିଡ଼ ଏବଂ ଶିଆର ରେ) ଓ ୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର × ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ସମତଳ ପ୍ରଶାଳୀ ରେ) ।

ରୋପଣ

ସୁସ୍ଥ ହଳଦୀ ର ରାଇଜୋମ୍ କୁ ବିହନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରୋ - ଟ୍ରେ ରେ ଅଂଶିକ ଡିକମ୍ପୋଜ ହୋଇଥିବା କୋଏର - ପିଟ୍ ଓ ଭର୍ମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ କୁ ୭୫ ଓ ୨୫ ଅନୁପାତ ରେ ଭରି ହଳଦୀ ର ରାଇଜୋମ୍



କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ସେହିଥିରେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଇଜୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇକୋଟେରମା (୧୦ ଗ୍ରାମ / କେଜି ପ୍ରତି) ମିଶ୍ରଣ କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଖତ

- ୪୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଖତ କୁ ୪୦ ଟନ୍ FYM, ୫ ରୁ ୧୦ ଟନ୍ ।
- ଭର୍ମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏବଂ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟନ୍ ସବୁଜ ପତ୍ର (ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି)କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ୨ ଟନ୍ / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ତେଲ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଏହା ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ ଅଛି ଯେ - ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨. ୫ ଟନ୍ FYM, ଏଜୋସ୍ପିରୁଲମ୍, ନିମ୍ନ କେକ୍ ୨ ଟନ୍ , କମ୍ପୋଷ୍ଟ କୋଏର ପିଚ୍ ୫ ଟନ୍ ଓ PSB ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ମୃତ୍ତିକା ର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହା ସହ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗ ର ପଦ୍ଧତି : ସାର କୁ ରୋପଣ ପୂର୍ବ ରୁ ମାଟି ରେ ମିଶାଯାଇ ଥାଏ ।

ଜଳସେଚନ : ୧୫ ରୁ ୪୦ ଦିନ ଜଳସେଚନ ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ।

ମୋଲଟିଙ୍ଗ୍ : ସବୁଜ ପତ୍ର ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି, ତାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ହରିତ ମଞ୍ଜରୀ ଗଛ କିମ୍ବା ଅରଖ ଗଛ ଆଦି ଉପରେ ଗୋବର କୁ ମୋଲଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ଘାସ ଦମନ : ଚାରା ରୋପଣ ହେବା ର ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ରୁ ୪ ଥର ଘାସ ବା ଟୁଣ କୁ ୩୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯତ୍ନ : ମାଟି କୁ ୩୦ ଦିନ ରୋପଣ ପରେ ଖୋସାଇ ବା କୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା' ପରେ ୫୦ -୬୦ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମାଟି ଖୋସା ଯାଇଥାଏ ।

ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟା ଚାଷ : ମକା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲିଡୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ତାଲି, ପନିପରିବା ଆଦି ଲଗା ଯାଇ ପାରିବ ।



ଗଛ ର ସୁରକ୍ଷା :

ଲିଫ୍ ଲୁଚ ରୋଗ ବା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଓ ରାଇଜୋମ୍ କିମ୍ବା ଚେର ସଜା ରୋଗ

ସୁସ୍ଥ ରାଇଜୋମ୍ ର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା ସହ ନିମ୍ନ କେକ୍ ଏକ କେଜି / ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

୦.୫% ନିମ୍ନ ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ୦.୫% ନିମ୍ନ ଚେଲ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଦା ରୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସିଞ୍ଚନ ଜୁଲାଇ ରୁ ଆକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ରେ ୨୧ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ କରିବା ଉଚିତ ।

ନେମାଟୋଡ଼ ର ସଂଖ୍ୟା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେକ୍ ସହିତ ପୋକୋନିଆ କ୍ଲୋରୋଫୋରାଥା ପରି ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମିସ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଅମଳ : ୮ ମାସ ପରେ ଯେତେ ବେଳେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅମଳ ର ପରିମାଣ : ୨୦, ୦୦୦ ରୁ ୨୦,୦୦୦ କେଜି / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ଅବା

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ : *Zingiber officinale*
Roscoe.

ଫ୍ୟାମେଲି : ଜିଙ୍ଗିବେରାସି

ଜଳବାୟୁ : ୧୫୦୦ MSL, ୨୮-୩୦°C
ତାପମାତ୍ରା ଅବା ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ଷା ଲେନ୍ଥ : ୨୫ - ୫୦ ଫୁଟ୍

କିଷମ : ଚାଇନା, ରିଓ - ଡି - ଜେନେରିଓ,
ରେଜାଆ ମାରନ, ହିମାଚଲ, ଆସାମ, କୁରୁପାମ୍ପାଡି, ଝିନାଡ଼ ଲୋକାଲ, ହିମଗିରି, ଭରତୀ, ମହିମା ।

OUAT ଦ୍ଵାରା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା କିଷମ : ସୁପ୍ରଭା, ସୁରୁତି, ସୁରଭି

ବିହନ ହାର : ୨୦୦ - ୧୦୦୦ କେଜି ମଞ୍ଜି ବା ରାଇଜୋମ୍ ଏକର ପ୍ରତି ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ : ୧ କେଜି ଗାଈ ଗୋବର ଖତ, ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକୋଡେରମା ର ମିଶ୍ରଣ ରେ ବିହନ ର ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ହଲ ୪ ରୁ ୫ ଥର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ନ କେକ୍ ର ପାଉଁଜର ମନ୍ଦା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।



ବିହନ ବୁଣିବା ର ସମୟ: ଅପ୍ରେଲ ରୁ ମେ ମଧ୍ୟ ରେ ବିହନ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବଧାନ : ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରେ ବ୍ୟବଧାନ ୨୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଛୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରେ ୪୦- ୪୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଖତ : ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି FYM ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟନ୍ ଓ ଭର୍ମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ୫ ଟନ୍ ଏବଂ ୨ ଟନ୍ ନିମ୍ବ କେକ୍ ସହ ମଲ୍ଚିଂ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗ ର ପଦ୍ଧତି: ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ରେ ସେହି ଖତ କୁ ମାଟି ରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ର ଚାଷ ବା କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ :

ଅଦା, କଦଳୀ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ପନିପରିବା ଆଦି ଚାଷ ସେହି ଜମି ରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଜଳସେଚନ ୪ ରୁ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମଲ୍ଚିଂ: ସବୁଜ ପତ୍ର ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ମଲ୍ଚିଂ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଘାସ ଦମନ: ଡୂଣ ବା ଘାସ ସବୁ ଦୁଇ ଥର ବଛା ଯାଇଥାଏ ।

ଗଛ ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ

କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ

କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ନିମ୍ବଗୋଲ୍ଡ (୦. ୫%) କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ତେଲ (୦. ୫%) ୨୧ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।



ଡିପେଲ୍ (ବାସିଲସ୍
ଥୁ ରି ° ଜେ ନ ସି ସ୍
ବ୍ୟାକଟେରିଆ ର
ଫର୍ମୁଲେସନ୍) ର ପ୍ରୟୋଗ
ଜୁଲାଇ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ରେ
କରାଯାଇଥାଏ ।

କନ୍ଦା ସଜା ବା ରାଇଜୋମ୍ ରଟ୍

ବିହନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ
ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରାଇଜୋମ୍ (କନ୍ଦା)
ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ
ଏବଂ ବିହନର ବିଶୋଧନ
ଗ୍ରାଇକୋଡେର୍ମା ହାରଜୀନମ୍
ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଦରକାର

ଏବଂ ବିହନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇକୋଡେର୍ମା ଭିରିଡି ଏବଂ ସିଉଡମୋନାସ୍ ଓ ଫ୍ଲୋରୋସେନସ୍ ର
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ଦା ସଜା ବା ରାଇଜୋମ୍ ରୋଟ୍ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କ୍ଷେତ ରେ ଗ୍ରାଇକୋଡେର୍ମା ହାରଜୀନମ୍ ସହିତ ନିମ୍ନ କେକ୍ (୧ କେଜି / ମହା ପ୍ରତି) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ
ଏହି ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ।

ଅମଳ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟନ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।



ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ ଓ ମୂଳକାଣ୍ଡ