



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୬

ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଗୁତାପ ଜନିତ ଭାରି ରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ

କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ

ବିଷୟ- ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଗୁତାପ

ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଲଗୁତାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୮ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଆଜି (୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬) ସକାଳ ୦୮:୩୦ ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୯° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୬.୦° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା)ର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିମି, କଳିଙ୍ଗପାଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବକୁ ୨୦୦ କିମି, ପୁରୀ (ଓଡ଼ିଶା)ର ଦକ୍ଷିଣକୁ ୨୧୦ କିମି ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ପୂର୍ବକୁ ୨୯୦ କିମି ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଗଭୀର ଲଗୁତାପ' (Deep Depression) ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖି, ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରୁ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭୋର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶାଖାପାଟନା ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ

ମଙ୍ଗଳବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା/ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସହ ୪୦-୫୦ କି.ମି./ଘ । ସହ ୬୦ କି.ମି./ଘ । ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା । (୩୦-୩୫ ମିମି ବର୍ଷା)

ବୁଧବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା/ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସହ ୪୦-୫୦ କି.ମି./ଘ । ସହ ୬୦ କି.ମି./ଘ । ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା । (୩୫-୪୦ ମିମି ବର୍ଷା)

ଗୁରୁବାର - କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା /ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । (୧୫-୨୦ ମିମି ବର୍ଷା)

ଶୁକ୍ରବାର - କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା /ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । (୧୧-୧୫ ମିମି ବର୍ଷା)

ଶନିବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ବର୍ଷା /ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । (୦୭-୧୦ ମିମି ବର୍ଷା)

ଭାରି ରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ

ଜିଲ୍ଲା	ଫସଲ / ପରିପରିବା / ଫଳ	ଅବସ୍ଥା	ଫସଲ / ପରିପରିବା/ ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ	କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ
କଟକ	ଖରିଫ ଧାନ	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଅବସ୍ଥା	- ଜଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ଯଥା - ପତ୍ରଛାଦପୋଡ଼ା, ପତ୍ରପୋଡ଼ା, କାଣ୍ଡପତା, ମହିଷା ରୋଗ ଓ କାହାଳୀ/ବଙ୍ଗାପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପତ୍ରମୋଡ଼ା, ଚକଡ଼ା ପୋକ, କେତାପୋକ । - ଘାସ ବିସ୍ତୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା । - ଅବାୟବିକ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା । - ମାଟିରେ ଜଳ ଓ ସାର ଗ୍ରହଣରେ ଅସୁବିଧା । - ତେର ମୂଳରେ ବିଶାଳ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜମାହେବା ।	- ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ଧାନ ଜମିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ (ଥୋଡ଼/କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା) ୫-୧୦ ସେ.ମି. ଓ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ୨-୫ ସେ.ମି. ଜଳସ୍ତର ରଖି ବଳକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ଆଗାମୀ ୨-୩ଦିନ ମୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ତଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ୪କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ୩କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ, କୀଟନାଷକ ପ୍ରୟୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । - ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ

ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୭୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକୃଳି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୬

				୫୦% + ଟ୍ରାଇଫୋସଫେଟ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି @ ୦.୪ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୭-୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ମାଇସିନ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ଓ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ଧାନଗଛରେ ପତ୍ରହାବପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଅଧିକ ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୨ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଲି. କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ୧ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧାନରେ କଣ୍ଟାସବା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗଛରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP ୧ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ଇଡିଫେନଫସ୍ ୫୦ଇ.ସି. @ ୧ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ଧାନ ଗଛରେ ବଙ୍ଗାୟ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଥାଇମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% WG @ ୪୦ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ୫% SC @ ୪୦୦ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ଧାନଗଛରେ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ପରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲେଡାପୋକ ଲାଗେ ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫% ଏସ୍.ସି କୁ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ମେଣ୍ଟୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁ ଆଗରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାନ ଜମିରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହାପାଇଁ ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ୫%SC କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହିସାବରେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନଟ୍ରାନ୍ସିପୋଲ ୧୮.୫%SC କୁ ପ୍ରତି ୧୦ଲି. ପାଣିରେ ୩ମି.ଲି. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ତ୍ତମାନର ସାପ୍ତାହିକ ୩୦-୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ଦିନ ଓ ୨୨-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ର ଅଧିକା ଆଦ୍ରତା ଯାହା ଧାନ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଡବିହ୍ନ ପୋକର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି କ୍ଲୋରା_ଡିଲିପ୍ରେଲ ୧୮.୫% ଏସସି ୬୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି ୧୦ କି.ଗ୍ରା କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଦେଖି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଣ୍ଟୁଆ ପାଗ ଓ ରାତିର କମ୍ ତାପମାତ୍ରା (୨୧-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ.ସି.)
--	--	--	--	---





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୬

			ଚକଡା/ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯଦି ଏହା ଲାଗେ ତେବେ ଜମିର ସୁଖୁ ପରିବେଶ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓଦା ଓ ଶୁଷ୍କ ଅବଳ ବଦଳ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପାଇମେଟ୍ରିକିନ୍ ୫୦% WG @ ୪୦ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁପ୍ରୋକ୍ସିମ୍ @ ୩୩୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ. @ ୫୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଗାସ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଗାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ ପାଇରିକ୍ସୋଡିକ୍ସିମ୍ ୧୦% ଏସ୍.ଏଲ୍ କୁ ୧୨୦ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗାସ ଉଠିବାର ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଆଖୁ	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ପିଲ ଅବସ୍ଥା	- ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି  - ନାଲି ସତା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ  	- ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ପାଗ ପରେ କୋଡାଖୋସା ଓ ଗାସ ବାଛି କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାର (୩୦କି.ଗ୍ରା. ସ୍ତରିଆ ପ୍ରତି ଏକର) ଫସଲ ୩୦-୬୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ନାଲିସତା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମାନକୋଜେବ୍ ୬୪% ଡବୁପି+ ମେଟାଲାଇକ୍ଲ ୮% @ ୪୦୦ଗ୍ରା. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	୬୦-୭୦ ଦିନ ଅବସ୍ଥା/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି  - ପତ୍ରପୋଡା, କାଷ୍ଠ ପତା ଓ ଫଲଆର୍ମି ଥ୍ଵାର୍ମ କୀଟ - ଫସଲର ଉଚ୍ଚତା ତଥା ବୃଦ୍ଧିରେ କମି ଓ ଅମଳ ହ୍ରାସ ।	- ମକାର ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ୩ଦିନ ପରେ ଗାସ ବାଛି ଆବଶ୍ୟକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଯବକ୍ଷାରଯାତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କମାକୁ ଏବଂ ପଟାସ ଓ ଫସଫରସ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବଢାନ୍ତୁ । - ଶୁଷ୍କ ପାଗ ପରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମକା ଫସଲରେ ଫଲଆର୍ମି ଥ୍ଵାର୍ମ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ଗ୍ରା. ଏମୋମେକ୍ସିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୫%ଏସ୍.କି କିମ୍ବା ୮୦ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନ-ଗ୍ରାନିଲୋପୁଲୋ ୧୮.୫%ଏସ୍.ସି. ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଅଧିକା ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ କାଷ୍ଠପତା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହା ଦେଖାଗଲେ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବୁପି ୩ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ମକାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ସବ୍‌ଷ୍ଟା ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩.୦%






ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୬

				ଏସଏଲ୍ କିମ୍ବା ହେକ୍ଟାକୋନାଜୋଲ ୫.୦% ଇସି ୪୦୦ ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	ନଳିତା	ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଘାସ ସମସ୍ୟା । - କାଣ୍ଡପତା ରୋଗ, ଲୋମଶ ସମ୍ଭାବୁଆ, ଧୂସର ଡିଜିଲ୍, ହଳଦିଆ ଅଷ୍ଟପଦା	- ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ଜମିରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଳିତା ଫସଲରେ ଅନାବନା ଘାସ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ୟୁଜାଲୋଫସ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୨ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୨-୩ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାସ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଡପତା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୩-୪ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆହୁତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିଥାଏ । ଲୋମଶ ସମ୍ଭାବୁଆ ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧-୧.୫ମି.ଲି. ଲମ୍ବତା ସାଇକ୍ଲୋଥ୍ରୀନ ୫ଇସି କିମ୍ବା ଇଷୋକ୍ସାକାର୍ବ ୧ମି.ଲି. କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଧୂସର ଡିଜିଲ୍ ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫୦ଇସି + ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୫ଇସି ୧-୧.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ହଳଦିଆ ଅଷ୍ଟପଦା ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଫେନପାଇରୋକ୍ସିମେଟ୍ ୧-୧.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୪ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	ଖରିଦ୍ ବାବାମ	ଫୁଲ ରୁ ଓହଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା / ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଛୁଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବା । - ରୋଗ ପୋକ ଯଥା- ପତ୍ରଚିତା, ମୂଳପତା, ପତ୍ରସୁତଙ୍ଗକାରୀ ପୋକ ।	- ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଫସଲର ଅମଳ ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ହେତୁ ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଫସଲ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । - ଯଦି ବର୍ଷା ପରେ ତିନାବାଦମର ମୁକସବା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟାକୋନାଜୋଲ ୫% ୧.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ଅଲୁରକାରିଆ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମେଟାଲିକ୍ସିଲ + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୬

		 	ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନାବାବାମରେ ପତ୍ରପୁତଳା ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମ ଜାତୀୟ କୀଟନାଷକ (ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ) ୩୦୦ ପିପିଏମ @ ୧ ଲି./ଏକର ଏବଂ ପରେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ ୫୦% ଲସି @ ୪୦୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫୦%+ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୫% ଲସି @ ୪୦୦ ମି.ଲି./ଏକର କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କାକୁଡି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା (କାକୁଡି, କଖାରୁ, ଜହ୍ନା, ପୋଟଳ, ତରଭୁଜ)	ଫୁଲ ରୁ ଫଳ ଅବସ୍ଥା / ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଫୁଲ ଝଡିବା - କାଷ୍ଠ ବା ଫଳ ପତ୍ତିବା - ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି - ବିଭିନ୍ନ କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ   	- ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ୨% ଡିଏପି + ୧ % ଏମୃପି କୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଝଡିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୦ପିପିଏମ୍ ନାପଥାଲିଲ୍ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କାକୁଡି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଜିମ୍ମୁଖୀ ପତ୍ରପୋଡା ଓ ଫାଇଫୋସ୍ପୋରା ପୋଡା ରୋଗ ଦେଖାଯିବ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଟାଲାଇକ୍ଲିମିଥାମିଡୋଜେବ @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର କିମ୍ବା ଆକୋକ୍ସିକ୍ସେବିନ୍+ଡେବୁକୋନାଜୋଲ @ ୦.୬ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବଳ ବଦଳ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା (ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି)	ଫୁଲ ରୁ ଚାଉ ଅବସ୍ଥା / ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ବିହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ - ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ ଓ ଚାଉ ନଷ୍ଟ । - ତଳିପତା ଓ ତଳିଘରା କଟା ରୋଗ । 	- ଯଦି ଫସଲ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । - ଫୁଲାଫୁଲ ଆଗାମୀ ୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତରୀତ ରଖନ୍ତୁ । - ତଳିଘରାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ତଳି କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ । - ଆଗକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ପରେ ଯଦି ଚାଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ତଳିପତା କିମ୍ବା ତଳିଘରାକଟା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ମେଟାଲାଇକ୍ଲିମିଥାମିଡୋଜେବ ୬୪% ଡେବୁକୋନାଜୋଲ ୪୦୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୨୭)
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେସିନ୍‌ଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ






ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୨

ପନିପରିବା (ବାଇଗଣ, ଟୋମାଟ, ଲଙ୍କା)	ବୁଣା ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡିବା  - ଫଳପତା ରୋଗ 	- ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ତଳି କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ପରେ ଯଦି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଓ ଟୋମାଟ ଆଦି ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବ । ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ସହିତ ୨୦ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପ୍ରେସ୍ତୋସାଇଫ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ପନିପରିବା ତଳିଘରାରେ ବର୍ଷା ପରେ ତଳିଘରାକଟା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତଳିଘରାରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଟାଲାଇକ୍ଲିଲ @ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. କୁ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ହେତୁ ଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଇଗଣରେ ଫଳପତା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି @ ୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା (ଝୁଡଙ୍ଗ)	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଗଛ ପଡିଯିବା - ଛୁଇଁ ବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା	- ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବା/ ଛୁଇଁ କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ପନିପରିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମୂଳରୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ପନିପରିବା (ଲେଣି)	ଫଳ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା - ବିଭିନ୍ନ କବକ ଜନିତ ରୋଗ 	- ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବା/ ଛୁଇଁ କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ହେତୁ ମାଟିରେ କବକ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି @ ୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୧
ତାରିଖ-୨୨/୦୯/୨୦୨୨

ଭାବୁଅନୁପ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

				ମୂଳରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଫଳ (କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା)	ଅଙ୍ଗାର ରୁ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	- କଦପତା ରୋଗ  - ମୂଳପତା ରୋଗ 	- କମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ୧୦ ଗ୍ରା ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଓ ୨୦ ଗ୍ରା, ଯୁରିଆକୁ ଅଙ୍ଗାରୁ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷାପରେ କଦଳୀରେ କଦପତା ରୋଗ ହେଲେ କମିରୁ ବଳକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ @ ୦୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ବର୍ଷା ପରେ ମୂଳପତା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ମୂଳ ମାଟିରେ ମେଟାଲାଇଲ୍ @ ୦୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଫାଇକା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୨ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ୦.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାସକୁ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	
ଛତୁ (ପାଳ ଛତୁ)	ଭାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ / ମଞ୍ଜି ପକାଇବା / ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	- ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ - ନଡା ପଡିଯିବା - ଭାତି ଭାଙ୍ଗିଯିବା	- ପାଳ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ଝରିତ ରଖନ୍ତୁ । - ଛତୁ ଭାତିକୁ ଭଲଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହା ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ । - ନଡାକୁ ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । - ପାଳ ଛତୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।	
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ			- ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୃହାଳ ଓ ପାର୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଛାତକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ । - ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ୫-୬ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟକ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ।	

